

أصدرت منظمة الصحة العالمية والميونيسيف بياناً مشتركاً توصي فيه بمكملات الزئبق لدى الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من الإسهال الحاد. هذا في ضوء نتائج البحوث التي أظهرت أن مكملات الزئبق، عندما تعطى خلال نوبات الإسهال الحاد، فإنها تقلل من شدة ومدة النوبة، وعندما تعطى لمدة 10-14 يوماً، تقلل الإصابة بالإسهال خلال 2-3 أشهر التالية.

هذا هو الدليل العلمي. وإذا كان هناك بلد يريد اعتماد هذه التوصية حول الزئبق، فإنه يحتاج إلى ترجمته إلى سياسات شاملة.

وهناك حاجة إلى اتخاذ عدة قرارات، على سبيل المثال تلك المتعلقة:

- أي مركب يمكن استخدامه
- إدراجه في قائمة الأدوية الأساسية الوطنية
- المشتريات والتوزيع
- سياسات التكلفة
- متطلبات الميزانية وتخصيصها
- تنقيح الأدلة الإرشادية السريرية والمواد التدريبية ذات الصلة
- نشر المعلومات عن السياسات، بما في ذلك إحاطة مسؤولي الصحة المعنيين على مختلف المستويات ومقدمي الخدمات الصحية، والمجتمعات المهنية، والأوساط الأكاديمية، والشركاء
- آلية لمتابعة التنفيذ وتقييم الآثار.

روابط ذات صلة

[إدخال الزئبق في برنامج مكافحة الإسهال](#)

Friday 3rd of May 2024 06:48:24 PM