

المأدوية	المتهاب الحلق بالمعقديات	المإحتياجات	مضادات الملاريا بالعضل	المبلد بالضم أفغانستان
DIA	QUI	SP	CHQ	
or MED	QUI	SP	CHQ	جيبوتي
SV	--	--	--	مصر
--	PEN V	(عن طريق الطبيب فقط)	(عن طريق الطبيب فقط)	جمهورية إيران الإسلامية
"	SP	^	CHQ Pyrimethamine	العراق
or MED	--	--	--	المغرب
DIA	--	--	--	الأراضي الفلسطينية المحتلة
--	PEN V	--	(علاج بالمستشفى فقط)	عمان
QUI	--	°	ACT	باكستان
	--	--	--	الجمهورية العربية السورية

SV

° ACT ° ACT السودان

-- -- -- تونس

DIA

° ACT ° ACT اليمن

ACT = معالجة معالجة = CHQ = بنيسلين بنزاسين = BP = أرتيزونات (لبوس) تحاميل = ARTsup = أموكسيسيلين = AMO = الأرتيميزين إلى تستند توليفية معالجة =
كلوروكين; DIA = ديازيبيرام; MEB = ميبندازول; MED = ميدازولام; PEN = بنيسلين V (إيروثروميسين إذا كان هناك حساسية
للبنسلين); PP = بيرانتل باموات; QUI = كينين; SP = سلفادوكسين بيريمثامين; SV = صوديوم فالبروات;

#التهاب الحلق بالعقديات

جيبوتي: يعطى الأموكسيسيلين للأطفال في عمر شهرين إلى 12 شهراً؛ ويعطى بنيسلين V للأطفال الأكبر عمراً؛ ويعطى الإريثروميسين لمن لديهم حساسية ضد البنسلين

العراق: إذا لم يتوفر بنزاسين بنيسلين، يعطى أموكسيسيلين لمدة 10 أيام؛ ويعطى الإريثروميسين لمن لديهم حساسية ضد البنسلين

المغرب: يعطى أموكسيسيلين للأطفال أصغر من عمر سنتين، ويعطى بنيسلين V للأطفال في عمر 24 حتى 36 شهراً؛ ويعطى بنزاسين بنيسلين للأطفال الأكبر من ذلك العمر؛ ويعطى الإريثروميسين لمن لديهم حساسية ضد البنسلين

الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجمهورية العربية السورية، وتونس: يعطى الماريثروميسين لمن لديهم حساسية ضد البنسيلين

” سلفادوكسين بيريميثامين

العراق: لا يعطى للأطفال أصغر من عمر سنتين

* مبيندازول:

أفغانستان: للأطفال في عمر سنة أو أكبر ولم يحصلوا على جرعة خلال الستة أشهر السابقة: 250 مليغرام إذا كان الطفل عمره سنتين

جيبوتي: إذا كان داء الأنكلستومات وداء الأتصورات متوطنًا في الإقليم، وإذا كان الطفل عمره سنتين أو أكبر، ولم يحصل على جرعة خلال الستة أشهر السابقة: 500 مليغرام

باكستان: للأطفال في عمر سنة أو أكبر ولم يحصلوا على جرعة خلال الستة أشهر السابقة: 500 مليغرام

اليمن: للأطفال في عمر سنتين أو أكبر ولم يحصلوا على جرعة خلال الستة أشهر السابقة: 500 مليغرام

^ بيريميثامين:

العراق: يعطى الكلوروكين للأطفال أكبر من عمر سنة، باستثناء الأطفال الذين لديهم موانع استعمال معينة أو مصابين بـ PD-6-G

لا يعطى سلفادوكسين-بيريميثامين للأطفال أصغر من عمر سنتين.

° المعالجة التوليفية التي تستند إلى الأرتيميزين:

باكستان تضم المعالجة التوليفية التي تستند إلى الأرتيميذين أدوية المخط الأول مع الأرتيزونات + سلفادوكسين-بيريميثامين

السودان، والميمن: تضم المعالجة التوليفية التي تستند إلى الأرتيميذين:

أ) أدوية المخط الأول: الأرتيزونات + سلفادوكسين-بيريميثامين

ب) أدوية المخط الثاني: أرتيميثير+ليوميضانترين

Sunday 19th of May 2024 12:56:18 AM