

18 نيسان/أبريل 2012 - يشكل العمى الذي يمكن تجنبه مشكلة صحية كبيرة في الصومال. ويقدر معدل انتشار العمى بنحو 1.2%، وهناك أكثر من 100.000 شخص مصابون بالعمى. ولما يزال الساد سبباً رئيسياً في الإصابة بالعمى. أما الأسباب الرئيسية الأخرى للإصابة بالعمى فهي عتامة القرنية والأخطاء الانكسارية والمياه الزرقاء.

وفي نيسان/أبريل 2008، تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن الوقاية من العمى بين منظمة الصحة العالمية ومستشفى المنهل التخصصي. وتمت الموافقة عليها من قبل وزارات الصحة المحلية، وكان لها أثر كبير على الوقاية من العمى في الصومال. وفي عام 2010، استعاد 10.014 شخص مصابون بالعمى أبصارهم. وقد أدى هذا إلى رفع معدل جراحات الساد بشكل كبير من 254 لكل مليون نسمة في عام 2006 إلى 1001.4 لكل مليون نسمة، كما أدى إلى تحسين إمكانية الوصول الجغرافي العادل لخدمات الرعاية الصحية للعيون ليصل معدل التغطية إلى أكثر من 80%.

وتدعم منظمة الصحة العالمية تنمية الموارد البشرية من أجل رعاية العيون من خلال تسهيل تدريب الأطباء الصوماليين وتوفير مستلزمات جراحات الساد والأجهزة التشخيصية والجراحية. ويقدم برنامج مكافحة العمى والوقاية منه للمكتب الإقليمي الدعم التقني المستمر الذي أدى إلى تحسن ملحوظ في كفاءة وفعالية تقديم خدمات رعاية العيون.

Tuesday 23rd of April 2024 01:15:56 PM