

حان وقت التطعيم
إذا أعطيت أحد لقاحات كوفيد-19 التالية،
اعرف متى يتصح بأخذ الجرعة الثانية.

فايزر	جرعتين (0.3 مل لكل منهما) عن طريق الحقن العضلي في العضلة الدالية وتوصى بفاصل زمني من 21 إلى 28 يومًا بين الجرعات.
موديرنا	جرعتين (0.5 مل لكل منهما) عن طريق الحقن العضلي في العضلة الدالية وتوصى بفاصل زمني مدته 28 يومًا بين الجرعات.
أسترازينيكا	جرعتين (0.5 مل) عن طريق الحقن العضلي في العضلة الدالية وتوصى بفاصل زمني من 3 إلى 12 أسبوعًا بين الجرعات.
جانسن	جرعة واحدة (0.5 مل) عن طريق الحقن العضلي في العضلة الدالية.
سينوفارم	جرعتين (0.5 مل) عن طريق الحقن العضلي في العضلة الدالية وتوصى بفاصل زمني من 3 إلى 4 أسابيع بين الجرعات.

تحميل

ما الذي تحتاج إلى معرفته عن لقاح أسترازينيكا

أكثر من 900 مليون جرعة أعطيت في جميع أنحاء العالم*
فعال للغاية في **الوقاية من الإصابة الشديدة** والمضاعفات طويلة الأمد والوفاة بسبب كوفيد-19
يمنع خطر الإصابة الشديدة بسبب بعض **سلالات** المتحورة للفيروس كوفيد-19
قد تحدث آثار جانبية **نادرة جدًا** تتعلق الدم مع انخفاض الصفائح الدموية بعد الجرعة الأولى
تحدث هذه **الآثار الجانبية النادرة جدًا** لدى 4-6 أشخاص من كل مليون شخص وفي أقل احتمالاً عند كبار السن
خطر تجلط الدم بسبب الإصابة بكوفيد-19 **أكثر بكثير** من خطر الجلطات الناتجة عن اللقاح

تحميل

حقائق عن لقاحات كوفيد-19
لقاح كوفيد-19 يحفز مناعة الجسم الطبيعية للتصدي للفيروس بحيث يمكنه مكافحة العدوى الحقيقية في المستقبل.

منظمة الصحة العالمية
المكتب الإقليمي لشرق المتوسط

تحميل



[تحميل](#)



[تحميل](#)



[تحميل](#)



[تحميل](#)



[تحميل](#)



[تحميل](#)



[تحميل](#)

Wednesday 1st of May 2024 07:45:41 PM