

في عام 2000 قُدِّرَت منظمة الصحة العالمية أن المستدمية النزلية B مسؤولة عن 8,13 مليون من الحالات المرضية الخطيرة وما يقرب من 371000 حالة وفاة سنوياً.

في عام 2008 قُدِّرَ إجمالي عدد الأطفال الذين ماتوا بسبب المستدمية النزلية B بـ 199000 حالة وفاة في العالم، منخفضاً عن الرقم الذي قُدِّرَ بحوالي 371000 في عام 2000، ويرجع ذلك أساساً إلى التهاب السحايا والتهاب الرئوي. وفي عام 2008 أيضاً، كان التهاب الرئوي مسؤولاً عن نحو 19% من وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات في إقليم شرق المتوسط. من بين هؤلاء، 20%–25% من الوفيات نجمت عن المستدمية النزلية B. وقد بلغت أمراض المستدمية النزلية B 900000 حالة تقريباً، نجم عنها أكثر من 48000 حالة وفاة في العام نفسه.

إن مضاعفات التهاب السحايا بالمستدمية النزلية B تشمل العمى، والصمم، والتخلف العقلي، وعجز التعلم، والموت. وإن معدل إماتة الحالات في التهاب السحايا بالمستدمية النزلية B هو حوالي 5%. وإن العواقب العصبية الدوخيمة تحدث في 10% إلى 15%، والصمم في 15% إلى 20% من الناجين.

وثائق ذات صلة

مراجعة الأدبيات العالمية عن الأمراض الغزوية بالمستدمية النزلية من النمط B والعقديات الرئوية بين الأطفال بعمر أقل من خمس سنوات 1980-2005. [مبايلايت 3.52 pdf]

التهاب السحايا بالمستدمية النزلية من النمط B في عصر ما قبل اللقاح: مراجعة عالمية للوقوع، والتوزيع العمري، ومعدلات إماتة الحالات، عام 2002. [كيلوبايت 813.85 pdf]

[تقدير الوفيات بالمستدمية النزلية و المكورات الرئوية لدى الأطفال دون سن 5 سنوات، عام 2008](#)

Thursday 18th of April 2024 03:49:55 PM