

لقد كان تلقيح الأطفال ضد المستدمية النزلية B ناجحاً جداً في تخفيض معدلات المرض بالمستدمية النزلية B بشكل كبير وفي التخلص تقريباً من المرض في البلدان التي أدخلت اللقاح مع تغطية عالية بالتلقيح، لكن المتلقين الأصحاء قد يبقون مستعدين للإصابة بمرض المستدمية النزلية B لمدة أسبوع أو أسبوعين ريثما يتم تطوير الأضداد.

إن لقاح المستدمية النزلية B متوفر حالياً بشكل مفرد أو في توليفات مختلفة. ويوصى بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح الذي يحتوي على المستدمية النزلية B للأطفال بأعمار 6 أسابيع أو أكثر، وبفاصل لا يقل عن أربعة أسابيع بين الجرعة الثانية والثالثة من اللقاح.

بعض الأطفال الأكبر سناً والمبالغون الذين يعانون من ظروف خاصة هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالعدوى بالمستدمية النزلية B، وينبغي تلقيحهم بجرعة واحدة من اللقاح إن لم يكونوا ملقحين في مرحلة الطفولة. وتشمل هذه الظروف مرض الخلية المنجلية، ونزاع المطحال، وزرع نقي العظم، ومعالجة السرطان بالأدوية التي تضعف جهاز المناعة، وفيروس العوز المناعي البشري.

Friday 26th of April 2024 09:11:49 PM