

لقد قررت اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط - في دورتها الـ 56 في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2009 - أن الهدف الإقليمي لمكافحة التهاب المكبد B سيكون الحد من انتشار العدوى المزمنة بالتهاب المكبد B إلى أقل من 1% بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات بحلول عام 2015.

والمقاح هو المسبب الأكثر فعالية لدوقاية من التهاب المكبد B، وقد أدى التلقيح ضد التهاب المكبد B في مرحلة الطفولة إلى انخفاض هام في العدوى بالتهاب المكبد B بين الأتراب الملقحين. وقد ازداد وسطي التغطية الإقليمية بالجرعة الثالثة من المقاح الحاوي على فيروس التهاب المكبد B من 39% إلى 84% بين عامي 2000 و 2010.

إن التحدي الرئيسي الذي يواجه تحقيق الهدف الإقليمي الخاص بالتهاب المكبد B هو عدم تطبيق جرعة الولادة من لقاح التهاب المكبد B في البلدان ذات العبء المرتفع، والتغطية المنخفضة بجرعة الولادة الفعلية (التي تعطى غضون 24 ساعة من الولادة) في معظم البلدان التي تطبق جرعة الولادة.

[التهديد المتميز بالتهاب المكبد B و C في إقليم شرق المتوسط: نداء من أجل العمل](#)

Wednesday 24th of April 2024 10:36:01 AM