تتوفر - حالياً أربعة لقاحات معطّلة ضد فيروس التهاب الكبد A. واللقاحات الأربعة جميعها مأمونة وفعالة وذات حماية طويلة الأمد، لكن لم يرخّص بإعطاء أي منها للأطفال دون السنة من العمر.

يمكن أن يعطى لقاح التهاب الكبد A لأي شخص يريد أن يُمنّع ضد هذه الحالة. لكن الأشخاص الذين يسافرون إلى أجزاء من العالم ليس فيها إصحاح جيد جداً يجب أن يُمنّعوا.

ويتوفر لقاح التهاب الكبد B كمستحضر أحادي التكافؤ أو ضمن توليفة ثابتة مع لقاحات أخرى، تتضمن الخناق-الكزاز-الشاهوق، والمستدمية النزلية من النمط B، والتهاب الكبد A، ولقاح شلل الأطفال المعطّل. وإن سلامة هذه التوليفات والاستجابة المناعية لها تماثل تلك التي تلاحظ عندما تعطى هذه اللقاحات بشكل منفصل.

يُنصح بإعطاء لقاح الكبد B لكل الرضع، وللأطفال الأكبر سناً والمراهقين الذين لم يتم تلقيحهم من قبل، وللبالغين المعرضين لخطر العدوى بفيروس التهاب الكبد B. ويجب إعطاء الجرعة الأولى من لقاح التهاب الكبد B خلال الـ 24 ساعة الأولى بعد الولادة حتى في البلدان ذات التوطّنية المنخفضة، ويجب أن تُتْبَع الجرعة الأولى بجرعتين أو ثلاث جرعات بفاصل زمني لا يقل عن أربعة أسابيع.

وقد تم إدخال لقاح التهاب الكبد B كجزء من التنمنيع الروتيني في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، باستثناء الصومال وجنوب السودان. ويتوقع أن يُدخَل في الصومال في أوائل عام 2013. وهنالك أربعة عشر بلداً تطبق جرعة الولادة من لقاح التهاب الكبد B.

Friday 4th of July 2025 05:53:51 AM