

لقد قدّرت منظمة الصحة العالمية أن الأمراض الإسهالية كانت مسؤولة عن حوالي 20% من الوفيات بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات في إقليم شرق المتوسط في عام 2008. كما أظهرت تقديرات منظمة الصحة العالمية أن الفيروسية العجلية مسؤولة عن حوالي 90000 حالة وفاة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات في إقليم شرق المتوسط في عام 2008، وهو ما يمثل حوالي 40% من وفيات الإسهال في هذه الفئة العمرية. وأظهرت الشبكة الإقليمية لترصد التهاب المعدة والأمعاء بالفيروسية العجلية أن الفيروسية العجلية هي سبب حوالي 40% من الحالات الإسهالية التي أدخلت إلى المستشفى بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات.

بروتوكولات شاملة لمراقبة تأثير التلقيح بالفيروسية العجلية على عبء مرض التهاب المعدة والأمعاء وعلى الذراري الفيروسية،
يناير/كانون الثاني 2009 [مخايليت; pdf 1,18]

Tuesday 23rd of April 2024 04:24:28 PM