



الميونيسف

بعد أسبوع من إعلان المشرق الأوسط عن حالة الطوارئ ضد شلل الأطفال في الإقليم، اتخذت الإجراءات للتطعيم الشامل ضد شلل الأطفال وغيره من الأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات.

جنيف، نيويورك، 8 تشرين الثاني/نوفمبر - يجري الإعداد لأكبر استجابة موحدة بالمتحصين في المشرق الأوسط لوقف تفشي مرض شلل الأطفال، وتهدف إلى تطعيم أكثر من 20 مليون طفل في سبعة بلدان ومناطق مرارا وتكرارا.

وقد قامت حملات التحصين الطارئة في سوريا، وما حولها لمنع انتقال شلل الأطفال وغيره من الأمراض التي يمكن توقيها، بتطعيم أكثر من 650,000 طفل في سوريا، بما في ذلك 116,000 في محافظة دير الزور في الشمالية الشرقية والتي تشهد نزاعاً شديداً حيث تم التأكد من تفشي مرض شلل الأطفال منذ أسبوع.

لم يشاهد في هذا الإقليم شلل الأطفال لمدة عشر سنوات تقريبا، وفي آخر 12 شهرا تم الكشف عن فيروس شلل الأطفال في عينات مياه الصرف الصحي من مصر وإسرائيل والمضفة الغربية وقطاع غزة. وقد حفزت فاشية شلل الأطفال في سوريا الاستجابة الجماعية الداهية. وهي أول فاشية شلل الأطفال تحدث في البلاد منذ عام 1999، وأوقعت حتى الآن 10 أطفال مصابين بالشلل، وتشكل خطرا على مئات الآلاف من الأطفال في جميع أنحاء الإقليم. وتشير الدلائل الأولية إلى أن الفيروس المسبب للمرض هو من أصل باكستاني ومشابه لسلسلة اكتشفت في مصر وإسرائيل والمضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكر الدكتور علاء العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط " لقد أظهرت منطقة المشرق الأوسط حسن تنسيق القيادة اللازمة لمكافحة الفيروس والمتخلص منه في الموعد النهائي: وذلك بالهجوم الموحد والمتواصل على الفيروس الممكن توقيه باللقاح، بالإضافة إلى الالتزام غير العادي بالهدف المشترك "

[المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال](#)

Saturday 17th of May 2025 10:08:22 PM