

في عام 1998، أصدرت جمعية الصحة العالمية قراراً لاستئصال شلل الأطفال، وأطلقت المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال. وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام، أصدرت اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط قراراً باهتمام هذا الهدف العالمي. وأعدت خطة إقليمية واعتمدت في عام 1989.

استمر عدد الحالات وعدد البلدان الموطونة في الانخفاض بسرعة من ما يقدر بـ 35000 حالة في عام 1988، تم الإبلاغ عنها من 22 بلداً، إلى 113 حالة مؤكدة من المناطق الفيروسية في عام 2004 في 3 بلدان موطونة فقط.

وقد أسفر ورود شلل الأطفال في الإقليم عن عدد محدود فقط من الحالات، تم السيطرة عليها بسرعة. مع ذلك، أدى ورود شلل الأطفال من تشاد في عام 2004 إلى ظهور الوباء في السودان، ووصل إلى اليمن في عام 2005 وإلى الصومال في عام 2006. واستمر ورود شلل الأطفال من البلدان المجاورة لما أن تأثيره في الإقليم كان محدوداً نتيجة للتأهب والاستجابة الملائمين. وأسفر ورود واحد في جنوب السودان في عام 2008 عن ظهور فاشية تنتشر إلى شمال السودان وإلى كينيا وأوغندا المجاورتين. انتهت هذه الفاشية في يونيو/حزيران 2009.

بدأت حالة شلل الأطفال تزداد سوءاً في عام 2007 نتيجة مجموعة من العوامل، بما في ذلك: انعدام الأمن، والكوارث الطبيعية، وضعف أداء حملات التحصين.

في أفغانستان، تكون الحالة الأمنية وراء استمرار انتشار شلل الأطفال في الجنوب.

الموصلات الإلكترونية ذات الصلة

[التقارير المرحلية](#)

Tuesday 23rd of April 2024 11:22:55 AM