



يدعم المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية حملة التطعيم الطارئة ضد الحمى المصفراء في دارفور والتي بدأت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2012

غطت المرحلة الثانية لحملة التطعيم ضد الحمى المصفراء حوالي 1.1 مليون نسمة أو 93% من السكان المستهدفين في جنوب، وغرب، ووسط دارفور.

وقد أثرت المفاشية على 35 منطقة في وسط، وجنوب، وغرب، وشمال، وشرق دارفور، وكان إجمالي عدد الحالات المشتبه بإصابتها، اعتباراً من السادس من شهر كانون الثاني/يناير 2013، قد بلغ 849، منهم 171 حالة وفاة (بلغ معدل الإماتة 20.1%).

أوصت منظمة الصحة العالمية، كجزء من خطة الاستجابة الطارئة، بتنفيذ المرحلة الثالثة من حملة التطعيم لحوالي مليونين من القانتين في كبابية، ويد المرسان (ومنطقة كبوم)، والوحدة، الشعرية (ومنطقة ياسين)،

والمداين، وروكيرو وام دخون.

ومن المقرر أن تصل إلى السودان 1 أول شحنة من التطعيم تحوي 670.400 جرعة في 14 كانون الثاني/يناير، متبوعة بشحنة ثانية مكونة من 702.000 جرعة، ثم شحنة ثالثة تتكون من 827.600 جرعة.

أنتهى العمل بالتقييم الوطني لمخاطر الحمى المصفراء في 29 كانون الأول/ديسمبر 2012 وكان الهدف منه هو إجراء المزيد من عمليات تقييم مخاطر الدوباء في سائر المناطق الأخرى بالمقطر. وقد تم جمع 1754 عينة دم من ثمانية مواقع بالمناطق الأيكولوجية الأربع في السودان. وقدم، إلى السودان، اخصائيو فيروسات من معهد باستور في داكار، عكفوا في المختبر الوطني للصحة العمومية على

تحليل العينات المجموعة.

روابط ذات صلة

[تقرير عن الحالة رقم 15، فاشية الحمى الصفراء في دارفور، 10 كانون الثاني/يناير 2013](#)

Friday 26th of April 2024 05:07:13 AM