

يعد داء المثقبيات البشري الأفريقي (مرض النوم) من أمراض المناطق المدارية المهملة، ويعد مرضاً مميتاً إذا لم يعالج. وينتشر المرض في البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في بؤر متفرقة، تقع أغلبها في مناطق ريفية ذاتية يصعب وصول الخدمات الصحية إليها، حتى أن علاج المرضى المصابين بداء المثقبيات غالباً ما يعتمد على موارد بشرية ومادية محدودة.

وبعد إدراج العلاج بالتوليفة المكونة من نيفورتييموكس-إيفلورنيثين في القائمة النموذجية للأدوية الأساسية لمعالجة المرحلة الثانية من داء المثقبيات البشري الأفريقي الجامبي، أنشأت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع البرامج الوطنية لمكافحة مرض النوم والمنظمات غير الحكومية نظاماً للإنذار الدوائي لتقييم سلامة وفعالية العلاج بالتوليفة المكونة من نيفورتييموكس-إيفلورنيثين أثناء استعمالها الروتين.

وصلات لمواقع ذات صلة

[رصد استعمال العلاج بالتوليفة المكونة من نيفورتييموكس-إيفلورنيثين في معالجة المرحلة الثانية من داء المثقبيات الأفريقي البشري الجامبي، بحوث وتقارير طب المناطق المدارية 2012: 93-101](#)

Saturday 17th of May 2025 09:19:49 PM