

Tableau 2 Pourcentage déclaré de désinfection des mains, port de gants, port de surblouse, port de masque et port de lunettes

Pratiques	Pourcentage de réponses affirmatives				<i>p</i>
	Médecins (<i>n</i> = 210) <i>n</i> (%)	Infirmiers (<i>n</i> = 307) <i>n</i> (%)	Autres catégories (<i>n</i> = 54) <i>n</i> (%)	Total (<i>n</i> = 571) <i>n</i> (%)	
Désinfection des mains avec un produit hydro-alcoolique ou lavage des mains dans les situations suivantes					
Après le retrait des gants	164 (78,1)	214 (89,7)	29 (53,7)	407 (70,3)	0,0001
Entre deux activités	178 (84,8)	236 (76,9)	31 (57,4)	445 (77,9)	0,0001
Entre deux patients	181 (86,2)	273 (88,9)	47 (87,0)	501 (87,7)	0,0001
Changement des gants à usage unique dans les situations suivantes					
Entre deux activités	115 (54,8)	166 (54,1)	36 (66,7)	317 (55,5)	0,2154
Entre deux patients	72 (34,3)	121 (39,4)	23 (42,6)	216 (37,8)	0,8229
Risque de contact avec du sang ou du liquide biologique d'origine humaine	155 (73,8)	235 (76,5)	42 (77,5)	432 (75,7)	0,8372
Risque de contact avec des muqueuses	130 (61,9)	202 (65,8)	40 (74,1)	372 (65,1)	0,1717
Risque de contact avec la peau lésée du patient	141 (67,1)	195 (63,5)	36 (66,7)	372 (65,1)	0,8414
Manipulation des prélèvements biologiques	109 (51,9)	157(51,1)	31 (57,4)	297 (52,0)	0,5902
Manipulation de linge sale	106 (50,5)	181 (59,0)	33 (61,1)	340 (56,0)	0,5637
Manipulation de matériel souillé	146 (69,5)	209 (68,1)	39 (72,2)	394 (69,0)	0,2331
Lorsque leurs mains comportent des lésions cutanées.	136 (64,8)	211 (68,7)	39 (72,2)	386 (67,6)	0,6789
Port de surblouse à usage unique dans les situations suivantes					
Risque de projection/d'aérosolisation de sang ou produits d'origine humaine	39 (18,6)	61 (19,9)	11 (20,4)	111 (19,4)	0,3660
Risque de contact avec du sang ou des produits d'origine humaine	43 (20,5)	64 (20,8)	10 (18,5)	117 (20,5)	0,5257
Port de masque à usage unique dans les situations suivantes					
Risque de projection/d'aérosolisation de sang ou produits d'origine humaine	51 (24,3)	87 (28,3)	18 (33,3)	156 (27,3)	0,6903
Suspicion d'infection respiratoire lors de soins auprès du malade	65 (31,0)	113 (36,8)	22 (40,7)	200 (35,0)	0,4432
Port de lunettes ou de visière dans les situations suivantes					
Risque de projection/aérosolisation de sang ou produits d'origine humaine	21 (10,0)	42 (13,7)	10 (18,5)	73 (12,8)	0,7384