

Tableau 4 Gravité de l'ATL et importance des séquelles en fonction des caractéristiques socioprofessionnelles et des suites de l'accident

Variables		ATL grave			Séquelles lourdes		
		Non (ITT < 90 j)	Oui (ITT ≥ 90 j)	p	Non (IPP < 15 %)	Oui (IPP ≥ 15 %)	p
Sexe	Masculin	85,6 %	91,6 %	0,11	89,2 %	90,5 %	0,64
	Féminin	14,4 %	8,4 %		10,8 %	9,1 %	
Obésité	Oui	11,1 %	5,9 %	0,12	89,2 %	90,5 %	0,11
	Non	88,9 %	94,1 %		10,8 %	9,1 %	
Poste de travail	G1	71,1 %	84,7 %	0,007	83,5 %	74,7 %	0,07
	G2	28,9 %	15,3 %		16,5 %	25,3 %	
Manutention lourde	Oui	53,3 %	41,9 %	0,06	49,5 %	37,4 %	0,04
	Non	46,7 %	58,1 %		50,5 %	62,6 %	
Traitement chirurgical	Oui	4,4 %	26,1 %	< 0,001	2,1 %	53,3 %	< 0,001
	Non	95,6 %	73,9 %		97,9 %	46,5 %	
Reprise du travail	Oui	94,4 %	91,6 %	0,39	94,6 %	87,9 %	0,03
	Non	6,5 %	8,4 %		5,2 %	12,1 %	
Pathologies vertébrales préexistantes	Oui	31,2 %	68,8 %	0,9	70 %	30 %	0,4
	Non	30,5 %	69,5 %		64,8 %	35,2 %	

ATL : accidents de travail lombaires ; G1 : groupe 1 (ouvriers non qualifiés, artisans et conducteurs de machine) ; G2 : groupe 2 (cadres, personnels de service et professions intermédiaires) ; ITT : incapacité temporaire totale ; IPP : incapacité permanente partielle.