

جدول ٢ تصورات الأطباء المشاركين حول الفحص الإلكتروني للتفاعلات الدوائية في وصفاتهم (العدد= ١٢٦).

عدد الاجابات	أعراض بشدة n (%)	أعراض n (%)	غير متأكد n (%)	أوافق n (%)	أوافق بشدة n (%)	
126	0 (0)	11 (8.7)	23 (18.3)	79 (62.7)	13 (10.3)	لدي معرفة كافية بالتفاعلات الدوائية
126	0 (0)	12 (9.5)	34 (27)	65 (51.6)	15 (11.9)	أنا على دراية بتصنيف التفاعلات الدوائية حسب أهميتها السريرية
126	1 (0.8)	3 (2.4)	3 (2.4)	50 (39.7)	69 (54.7)	عند كتابة وصفة طبية، أسأل المريض عن أدوية أخرى يأخذها في نفس الفترة
122	1 (0.8)	6 (4.9)	9 (7.4)	62 (50.8)	44 (36.1)	عند كتابة وصفة طبية، أتأكد من خلوها من التفاعلات الدوائية
125	1 (0.8)	5 (4)	30 (24)	59 (47.2)	30 (24)	إذا اكتشفت وجود تفاعل دوائي في وصفتي، فأنا على ثقة بقدرتي على التعامل معه
123	12 (9.8%)	44 (35.8)	14 (11.4%)	49 (39.8)	4 (3.2)	أنا أعتمد على ذاكرتي للتحقق من وجود تفاعلات دوائية
124	2 (1.6)	11 (8.9%)	7 (5.6)	78 (62.9)	26 (21)	للتحقق من وجود تفاعلات "I-Seha" أعتمد على دوائية
126	23 (18.3)	66 (52.4)	17 (13.5)	15 (11.9)	5 (3.9)	أعتمد على الصيدلاني في فحص التفاعلات الدوائية
124	0 (0)	1 (0.8)	10 (8)	42 (33.9)	71 (57.3)	أود أن أشارك في دورة تدريبية حول التفاعلات الدوائية