

Tableau 3 Pratiques liées au tabac par les mères libanaises et niveau de tabagisme

Variable	Total	Tabagisme léger (n = 313)	Tabagisme moyen (n = 205)	Tabagisme lourd (n = 265)	Tabagisme très lourd (n = 217)	p <sup>a</sup>	Moyenne (E.T.) paquet/jour
	Nbre (%)	Nbre (%)	Nbre (%)	Nbre (%)	Nbre (%)		
<i>Causes du tabagisme</i>							
Sentiment de maturité	45 (4,5)	10 (3,2)	12 (5,9)	12 (4,5)	11 (5,1)	0,34	1,04 (0,51)
Influence de l'entourage	470 (47,0)	127 (40,6)	98 (47,8)	133 (50,2)	112 (51,6)	0,20	1,00 (0,63)
Confort psychique	220 (22,0)	71 (22,7)	40 (2,0)	59 (22,3)	50 (23,0)	0,25	1,05 (0,60)
Passe-temps	261 (26,1)	109 (34,8)	52 (25,4)	58 (21,9)	42 (19,4)	0,38	0,86 (0,54)
Plaisir	242 (24,2)	81 (25,9)	51 (24,9)	64 (24,2)	46 (21,2)	0,66	0,94 (0,59)
<i>Arrête de fumer si grossesse</i>							
Oui	459 (45,9)	183 (58,5)	110 (53,7)	108 (40,8)	58 (26,7)	0,79 (0,52)	
Non	641 (64,1)	130 (41,5)	95 (46,3)	157 (59,2)	159 (73,3)		1,12 (0,64)
<i>Diminue le tabac si grossesse</i>							
Oui	250 (25,0)	75 (24,0)	51 (24,9)	75 (28,3)	49 (22,6)	0,45	0,99 (0,52)
Non	750 (75,0)	238 (76,0)	154 (75,1)	190 (71,7)	168 (77,4)		0,96 (0,64)
<i>Arrête si coût du tabac augmente</i>							
Oui	333 (33,3)	123 (39,3)	77 (37,6)	77 (29,1)	56 (2,8)	0,001	0,87 (0,56)
Non	632 (63,2)	181 (57,8)	122 (59,5)	178 (61,2)	151 (69,6)		1,02 (0,64)
Ne sait pas	35 (3,5)	9 (2,9)	6 (2,9)	10 (3,8)	10 (4,6)		0,89 (0,46)

<sup>a</sup> Résultats de l'ANOVA, sauf pour les causes du tabagisme (test du  $\chi^2$ ).