

Tableau 4 Connaissances concernant les effets du tabac sur la santé par les mères libanaises et niveau de tabagisme

Connaissance	Population totale (n = 1000) Moyenne (E.T.)	Tabagisme léger (n = 313) Moyenne (E.T.)	Tabagisme moyen (n = 205) Moyenne (E.T.)	Tabagisme lourd (n = 265) Moyenne (E.T.)	Tabagisme très lourd (n = 217) Moyenne (E.T.)	p
Effets sur le fumeur	5,07 (3,42)	5,11 (3,35)	5,08 (3,39)	5,05 (3,43)	5,04 (3,57)	0,20
Effets sur la grossesse et le fœtus	2,4 (3,15)	2,77 (3,39)	2,48 (2,93)	2,47 (3,29)	1,70 (2,72)	0,004
Effets sur le nourrisson	1,89 (1,47)	2,08 (1,51)	1,91 (1,34)	1,76 (1,48)	1,74 (1,51)	0,003
Passage dans le lait [Nbre (%)]	698 (69,8)	235 (75,1)	157 (76,6)	185 (69,8)	121 (55,8)	< 0,0001
Inhalation par le nourrisson [Nbre (%)]	879 (87,9)	282 (90,1)	189 (92,2)	228 (86,0)	180 (82,9)	0,01
Score total ^a	10,94 (6,39)	11,61 (6,65)	11,16 (6,14)	10,85 (6,37)	9,87 (6,14)	0,004

^aLe score total des connaissances (maximum = 26) est la somme des effets sur le fumeur lui-même (maximum = 9), les effets durant la grossesse (maximum = 10) et ceux concernant le nourrisson (tabagisme passif) (maximum = 5), en plus des questions concernant le passage des constituants du tabac dans le lait maternel durant l'allaitement (1 point) et la possibilité d'inhalation de la fumée de tabac par le nourrisson (1 point).