

Tableau 3 État des connaissances sur le virus de l'hépatite B : contamination, signes cliniques, prévention

Item	Groupes															
	1 (n = 100)		2 (n = 200)		3 (n = 150)		4 (n = 450)		5 (n = 100)		6 (n = 100)		7 (n = 100)		8 (n = 550)	
	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%
Contamination par le sang	67	67	196	98	144	96	297	66	53	53	75	75	95	95	390	71
Contamination par les rapports sexuels	52	52	162	81	126	84	207	46	23	23	37	37	60	60	132	24
Contamination par les mains sales, la salive, l'eau du robinet	70	70	124	62	45	30	171	38	35	35	23	23	23	23	143	26
Connaissance d'au moins 2 signes cliniques	90	90	200	100	150	100	283	63	40	40	75	75	45	45	137	2
L'infection par le VHB peut exister sans donner de signes	65	65	160	80	150	100	256	57	48	48	77	77	83	83	341	62
Modes de protection																
Préservatif	45	45	172	86	144	96	193	43	23	23	38	38	53	53	82	15
Seringues à usage unique, en évitant de partager les rasoirs	45	45	172	86	144	96	189	42	33	33	49	49	73	73	242	44
Existence d'un vaccin	55	55	144	72	120	80	238	79	70	70	73	73	85	85	418	76

Groupes 1 : lycéens ; 2 : étudiants en 1^{re} année de médecine ; 3 : étudiants en 5^e année de médecine ; 4 : étudiants de différentes facultés ; 5 : ouvriers ; 6 : cadres ; 7 : personnel paramédical ; 8 : donneurs de sang vus au CRTS de Casablanca.