

**Tableau 4 État des connaissances sur le virus de l'hépatite C : contamination, signes cliniques, prévention**

Item	Groupes															
	1 (n = 100)		2 (n = 200)		3 (n = 150)		4 (n = 450)		5 (n = 100)		6 (n = 100)		7 (n = 100)		8 (n = 550)	
	Nbre	%														
Contamination par les rapports sexuels	32	32	164	82	112	75	180	40	16	16	38	38	34	34	192	35
Contamination par la brosse à dents	57	57	176	88	135	90	261	58	33	33	33	33	87	87	170	31
Contamination par les seringues mal stérilisées	57	57	176	88	135	90	216	48	33	33	49	49	91	91	236	43
Contamination par les instruments du dentiste mal stérilisés	57	57	176	80	135	90	153	34	26	26	25	25	79	79	159	29
L'infection par le VHC peut exister sans donner de signes	60	60	156	78	120	80	252	56	47	47	65	65	90	90	258	47
Inexistence de vaccin contre le VHC	40	40	52	26	30	20	225	50	25	25	37	37	75	75	121	22
Protection par le respect des règles de stérilisation	60	60	196	98	135	90	256	57	48	48	65	65	90	90	220	40
Inexistence de traitement efficace	46	46	120	60	30	20	162	36	36	36	40	40	32	32	308	56
Le risque persiste malgré les mesures préventives	57	57	136	68	130	87	202	45	30	30	43	43	51	51	126	23

Groupes 1 : lycéens ; 2 : étudiants en 1<sup>re</sup> année de médecine ; 3 : étudiants en 5<sup>e</sup> année de médecine ; 4 : étudiants de différentes facultés ; 5 : ouvriers ; 6 : cadres ; 7 : personnel paramédical ; 8 : donneurs de sang vus au CRTS de Casablanca.