

Tableau 3 Distribution des troubles de la croissance (Z scores < -2) selon le poids de naissance^a

Âge (mois)	Poids de naissance (g)						p
	< 2500		2500-4000		> 4000		
	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%	
<i>Retard de croissance</i>							
3	85	33,3	37	1,7	0	0	< 0,001
5	78	31,6	57	2,6	1	0,4	< 0,001
9	70	28,8	81	3,9	2	0,9	< 0,001
18	86	36,1	85	4,0	1	0,4	< 0,001
<i>Insuffisance pondérale</i>							
3	72	28,2	7	0,3	0	0	< 10 ⁻³
5	45	19,7	5	0,2	0	0	< 10 ⁻³
9	72	30,1	32	1,5	0	0	< 10 ⁻³
18	33	14,2	13	0,6	0	0	< 10 ⁻³
<i>Émaciation</i>							
3	52	21,0	35	1,7	1	0,5	< 10 ⁻³
5	43	19,4	41	2,1	1	0,5	< 10 ⁻³
9	23	10,5	39	2,1	3	1,4	< 10 ⁻³
18	5	2,3	25	1,3	0	0	0,1
<i>Obésité</i>							
3	3	1,5	110	5,1	56	21,4	< 0,001
5	17	8,7	162	7,7	56	21,7	< 0,001
9	18	8,4	231	11,2	52	20,0	< 0,001
18	15	6,6	189	9,3	55	21,3	< 0,001

^a Les différents pourcentages ont été calculés à partir du nombre de nourrissons vus à l'âge indiqué.