



تقرير الحالة الأسبوعي (الأسبوع 27)  
11-15 يوليو/تموز 2021

مرض فيروس كورونا  
(كوفيد-19)

المكتب القطري لمنظمة الصحة  
العالمية

عدد الوفيات



17,548

عدد حالات الشفاء



1,306,454

عدد الحالات المؤكدة



1,429,362

عدد الحالات النشطة



105,360

عدد الفحوص



12,211,053

## النقاط الرئيسية:

1. شب حريق في مركز عزل المصابين بكوفيد-19 في مستشفى الامام الحسين بمحافظة ذي قار جنوب العراق، وتسبب في وفاة أكثر من 94 شخصاً من المرضى ومرافقيهم وفقاً لتقارير وزارة الصحة. تعرب منظمة الصحة العالمية في العراق عن حزنها وأسفها الشديد للخسائر في الأرواح وتقدم تعازيها الحارة لأسر الضحايا.
2. في الأسبوع 27، استمر المنحنى الوبائي لكوفيد-19 بالارتفاع في عدد الحالات المبلغ عنها والوفيات ذات الصلة بالمرض. وقد أبلغت وزارة الصحة عن إجمالي 57,887 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 هذا الأسبوع، ما يمثل 140 حالة إصابة لكل 100 ألف من السكان. وبلغ عدد الوفيات الجديدة المتصلة بكوفيد-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع 232 حالة، مع معدل إماتة حالات 0.4%.
3. سجلت المحافظات الثلاث النجف وذي قار والديوانية معدل العدوى المجتمعية الأعلى بكوفيد-19 في الأسبوع 27، والذي بلغ ما يزيد عن 150 حالة إصابة لكل 100 ألف من السكان.
4. لا تزال العدوى المجتمعية منتشرة بشكل كبير في جميع أنحاء العراق، ما ينذر بارتفاع محتمل في معدلات الإصابة، خصوصاً مع دخول المحافظات الثلاث المذكورة أعلاه ضمن الفئة عالية المخاطر هذا الأسبوع.
5. تم إعطاء إجمالي 1,330,393\* جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع، ما يعني أن 5.76% من السكان المستهدفين في العراق قد حصلوا حتى الآن على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19.
6. كشفت بيانات التلقيح، حتى الآن، عن إعطاء 529,176 جرعة من لقاح استرازينيكا، و430,102 جرعة من لقاح فايزر، و368,115 جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.




### ملاحظات للقراء:


- 1) مصدر البيانات الواردة في تقرير الحالة هذا هو نظام الإبلاغ اليومي لوزارة الصحة العراقية.
- 2) يمكن الحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية من خلال لوحة المعلومات التفاعلية لدى منظمة الصحة العالمية في العراق: <https://bit.ly/2SINwik>

## 1. الحالة الوبائية للمرض في الأسبوع 27، (5-11 يوليو/تموز 2021)

- بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بكوفيد-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع 57,887، ما يمثل زيادة قدرها 12,112 حالة مقارنة بالأسبوع 26. بلغت نسبة التغير للفترة المشمولة بالتقرير (26.4 مقارنةً بالأسبوع 26) و (6.9 مقارنةً بالأسبوع 16) - ذروة تصاعد حالات الإصابة الحالية. بلغ تمثيل حالات الإصابة الإيجابية بكوفيد-19 هذا الأسبوع 140 حالة لكل 100 ألف من السكان.




الشكل 1: المنحنى الوبائي للمرض في العراق خلال الأسبوع 27، 2021




الشكل 2: المنحنى الوبائي للمرض في العراق (الأسبوع 27) 2021-2020

- بلغ إجمالي عدد فحوص RT-PCR التي أجريت خلال الأسبوع (27) 320,948 فحصاً، ما يعكس زيادة قدرها 8,793 فحصاً مقارنة بالأسبوع 26، بمعدل 7,792 فحصاً لكل مليون من السكان.




الشكل 3: الشكل 3: فحوص RT-PCR في العراق في الأسبوع 27، 2021

- يشير معدل الإيجابية في الأسبوع 27 إلى ارتفاع جديد في الحالات المبلغ عنها مقارنة بالحالات المسجلة في الأسبوع 16 (ذروة التصاعد الأخير في عدد الحالات). إذ ارتفع المعدل بشكل ملحوظ هذا الأسبوع ليصل إلى 18% مقارنة بنسبة 15% المسجلة في الأسبوع الماضي. والمحافظات التي سجلت أعلى معدل إيجابية لهذا الأسبوع هي ذي قار 35% و كربلاء 34% وميسان والمثنى 31% لكل منهما. بالمقابل، تم تسجيل أدنى معدل في الأنبار ونينوى عند 3% و6% على التوالي.




الشكل 4: معدل الإيجابية لكوفيد-19 في العراق - الأسبوع 27، 2021

- بلغ عدد حالات الوفاة المتصلة بالمرض هذا الأسبوع 232 حالة، ما يمثل زيادة قدرها 7 حالات وفاة مقارنة بالأسبوع الماضي. أما معدل إماتة الحالات فقد انخفض نقطة واحدة إلى 0.5%، وهو لا يمثل فرقاً كبيراً عن معدل إماتة الحالات المُبلغ عنها في الأسابيع السابقة.




الشكل 5: توزيع حالات الوفاة الناجمة عن كوفيد-19 في العراق - الأسبوع 27، 2021

- بلغ متوسط عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات في الأسبوع (27) 2,539 مريضاً يومياً مع معدل إماتة في المستشفيات بلغ 1.3%. كما انخفض معدل المرضى المعالجين في وحدة العناية المركزة هذا الأسبوع نقطة واحدة ليصل إلى 21% مقارنة بـ 22% في الأسبوع 26.



الشكل 6: متوسط عدد مرضى كوفيد-19 في المستشفيات ووحدة العناية المركزة حسب الأسابيع - الأسبوع 27، 2021

- الفئات العمرية الأكثر تضرراً هذا الأسبوع هي الفئة العمرية (الأعلى من 15-45 سنة)، والفئة العمرية (الأعلى من 45-65 سنة)، بمعدل 59% و26% على التوالي أما بالنسبة للوفيات، فقد سجلت أعلى نسبة وفيات بين الفئات العمرية (الأعلى من 65-45 سنة) و(الأعلى من 65 سنة)، بمعدل 38% و52% على التوالي.
- يشير توزيع حالات الإصابة والوفاة بين الذكور والإناث في الأسبوع 27 إلى 1.5 و1.6 على التوالي.



الشكل 7: التوزيع الجنساني لحالات الإصابة/الوفيات المؤكدة بكوفيد-19 حسب الفئة العمرية في الأسبوع 27، 2021

ملاحظة: (تشير القيمة \*0 في الشكل 7، المخطط الدائري الأيمن، إلى عدد الوفيات الفعلي البالغ 11 وفاة)

## 2. المؤشرات الوبائية للأسبوع 27:

خلال الأسبوع 27، استمرت العدوى المجتمعية بالانتشار بشكل كبير في العراق وفقاً لثلاثة مؤشرات وبائية رئيسية هي مؤشرات الإصابات والوفيات ومعدل الإيجابية. وسجلت المستويات الأعلى في ذي قار والنجف والديوانية، فيما سجلت المستويات الأدنى في الأنبار ونيوى وصلاح الدين.


المحافظة	حالة بين كل 100 ألف	وفاة بين كل 1 مليون	معدل الإيجابية	حالة بين كل 100 ألف	وفاة بين كل 1 مليون	معدل الإيجابية	المجموع 1	المجموع 2	المجموع 3	المجموع العام	المستوى
الأنبار	13	0	3	متوسطة	منخفضة	منخفضة	2	1	1	4	متوسطة
بابل	91	6	18	هائلة	متوسطة	هائلة	3	2	3	8	هائلة
بغداد	196	7	21	عالية	متوسطة	عالية	4	2	4	10	هائلة
البصرة	198	7	24	عالية	متوسطة	عالية	4	2	4	10	هائلة
الديوانية	168	10	23	عالية	هائلة	عالية	4	3	4	11	عالية
ديالى	122	1	20	عالية	منخفضة	هائلة	4	1	3	8	هائلة
كربلاء	248	8	34	عالية	متوسطة	عالية	4	2	4	10	هائلة
كركوك	77	8	13	هائلة	متوسطة	هائلة	3	2	3	8	هائلة
كردستان	111	6	10	عالية	متوسطة	متوسطة	4	2	2	8	هائلة
ميسان	207	7	31	عالية	متوسطة	عالية	4	2	4	10	هائلة
المتن	155	5	31	عالية	منخفضة	عالية	4	1	4	9	هائلة
النجف	182	11	24	عالية	هائلة	عالية	4	3	4	11	عالية
نيوى	33	1	6	متوسطة	منخفضة	متوسطة	2	1	2	5	متوسطة
صلاح الدين	51	1	7	هائلة	منخفضة	متوسطة	3	1	2	6	متوسطة
ذي قار	197	12	35	عالية	هائلة	عالية	4	3	4	11	عالية
واسط	219	1	29	عالية	منخفضة	عالية	4	1	4	9	هائلة
العراق	141	6	18	عالية	متوسطة	هائلة	4	2	3	9	هائلة

جدول 1: العلوى المجتمعية بكوفيد-19 في العراق في الأسبوع 27، 2021

### 3. تأهب واستجابة منظمة الصحة العالمية:


#### أ) حملة التطعيم ضد كوفيد-19:

- حتى الأسبوع 27، تم إعطاء إجمالي 1,330,393 \* جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد، ما يعني أن 5.76% من السكان المستهدفين في العراق قد حصلوا حتى الآن على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19. تشير البيانات المبلغ عنها أيضاً أن 833,097 من السكان المستهدفين على الأقل قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تم تحصين 497,296 تحصيماً كاملاً بكلتا الجرعتين.
- كشفت إحصائيات إعطاء اللقاح في الأسبوع 27 أن 548,359 (66%) من الذكور قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح مقابل 277,648 (34%) من الإناث. فيما حصل 321,654 (65%) من الذكور على الجرعة الثانية مقابل 173,246 (35%) من الإناث. وما يزال الاقبال على اللقاح منخفضاً بين النساء مقابل الرجال، وقد يكون ذلك مرتبطاً بميل الإناث إلى البقاء في المنزل لرعاية أسرهن بالإضافة إلى الشائعات حول الآثار الجانبية للقاح.
- يشير تحليل بيانات بدء التطعيم أن 378,926 (28%) من المجموعات ذات الأولوية التي تم تلقيحها تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، تليها 951,467 (72%) من الفئة العمرية 18-50 عاماً.
- تشمل المحافظات التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم باستخدام الجرعة الأولى بغداد - الكرخ بمعدل (7%)، تليها النجف (5.9%)، والبصرة (5.2%)، وكربلاء (4.6%)، والديوانية (3.2%)، وبابل وكركوك (3.8%) لكل منهما. من ناحية أخرى، سُجل أقل عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم خلال الأسبوع 27 في السليمانية بمعدل (1.3%)، وميسان (2.1%)، ونيوى (2.2%) وصلاح الدين وواسط (2.5%) لكل منهما.




الشكل 8: قيم التطعيم اليومية ضد كوفيد-19 في الأسبوع 27، 2021

..... **ملاحظة:** وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة هذا الأسبوع، بلغ إجمالي عدد الجرعات المقدمة للسكان في العراق 1,330,393 \* جرعة. ويمثل هذا الرقم عدد الجرعات الذي تبلغ عنه يوميًا دوائر الصحة في جميع المحافظات. ولكن، تجدر الإشارة إلى أن التقارير المتعمقة الواردة من النظام الوطني تستغرق عادة بضعة أيام حتى يتم الانتهاء من إعدادها، ما يفسر الاختلاف في الأرقام بين الإحصائيات داخل لوحة المعلومات التفاعلية لمنظمة الصحة العالمية والأرقام اليومية التي تبلغ عنها وزارة الصحة.



الشكل 9: التطعيم في العراق حسب نوع اللقاح/الشهر - الأسبوع 27، 2021

### (ب) تنسيق أنشطة كوفيد-19 مع السلطات الصحية المحلية:



الشكل 10: حالة كوفيد-19 في مخيمات محافظة السليمانية - الأسبوع 27، 2021

- في السابع من الشهر الحالي، جمعت مراكز الرعاية الصحية الأولية في مخيم عربت للاجئين في محافظة السليمانية مسحات من الحلق للحالات المشتبه بإصابتها بكوفيد-19 (عائلة سورية لاجئة مكونة من 6 أفراد). وكانت نتائج الفحوصات إيجابية لرب الأسرة البالغ من العمر 37 عاماً واثنين من الأفراد الذين كانوا على اتصال مباشر به (الابنة 9 سنوات والابن 12 عاماً). وظهرت على جميع الحالات أعراض خفيفة تم علاجها التحكم في المنزل. يوضح الشكل 10 الوضع الحالي لكوفيد-19 في مخيمات المحافظة.

- أجرى فريق منظمة الصحة العالمية في محافظة السليمانية زيارة مراقبة إلى جناح العناية المركزة لمرضى كوفيد-19 والذي تم افتتاحه حديثاً في مستشفى الشهيد هيمن التعليمي بسعة تبلغ 24 سريراً. ووجد الفريق خلال الزيارة أن 24 جهازاً من أجهزة التنفس الاصطناعي في الجناح، والبالغ عددها 24 جهازاً، كانت معطلة بسبب عدم توفر قطع الغيار، إذ لم تتمكن السلطات المحلية من توفير تلك القطع بسبب محدودية موارد صيانة المعدات. ولكن تُواصل العيادة الخاصة بكوفيد-19 في المستشفى إعطاء اللقاح من الساعة 8:30 صباحاً إلى 11:00 مساءً يومياً على مدى 5 أيام في الأسبوع.



صورة 1: فريق منظمة الصحة العالمية في السليمانية يزور جناح العناية المركزة لمرضى كوفيد-19 في مستشفى الشهيد هيمن، يوليو/تموز 2021. منظمة الصحة العالمية في العراق



صورة 2: عيادة الاستشارة الخاصة بكوفيد-19 في مستشفى الشهيد هيمن بالسليمانية، يوليو/تموز 2021. منظمة الصحة العالمية في العراق

- أجرى الفريق الفني لمنظمة الصحة العالمية في محافظة دهوك / إقليم كردستان زيارة مراقبة إلى مركز خبات للرعاية الصحية الأولية في قضاء خبات لمراقبة إدارة التطعيم ضد كوفيد-19، وظروف سلسلة التوريد، وسبل تعزيز الإقبال على اللقاح بين المجتمع المضيف في القضاء والمحافظة.

- علاوة على ذلك، دعمت منظمة الصحة العالمية دائرة صحة محافظة دهوك بشحنة تتضمن من مجموعتين مخصصتين ومجموعة أدوات لعلاج الصدمات بهدف المساعدة في مواجهة النقص الحاصل في الأدوية والإمدادات الطبية في مرافق الصحة العامة في المحافظة. كما تم تسليم ثماني منصات إضافية من الأدوية والمستلزمات الطبية لدعم مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تخدم مخيمات اللاجئين الأربعة في دهوك (دوميز 1 ودوميز 2 وكويلان وعقرة) لتعزيز تقديم الخدمات الصحية في المخيمات المذكورة.



صورة 3: شحنة الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من منظمة الصحة العالمية إلى دهوك، يوليو/تموز 2021. منظمة الصحة العالمية في العراق



صورة 4: فريق منظمة الصحة العالمية في دهوك يزور مركز خبات للرعاية الصحية الأولية لمراقبة التطعيم والقضايا ذات الصلة، يوليو/تموز 2021. منظمة الصحة العالمية في العراق



## ت) الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية:

1. إدارة الخرافات والمعلومات الخاطئة: أنشأ مقر منظمة الصحة العالمية مركزاً لإدارة المعلومات يمكن الوصول إليه من خلال التفاصيل الواردة في المربع الإعلاني أدناه:  
(لمزيد من المعلومات حول الدعوة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية للعمل وكيف تصبح أحد الموقعين، انقر [هنا](#))



2. التعلم الصحي عبر الإنترنت: وسعت منظمة الصحة العالمية نطاق الوصول إلى التعلم عبر الإنترنت من خلال إنشاء منصة تعليمية مفتوحة حول كوفيد-19 وحالات الطوارئ الصحية الأخرى.

ونشرت المنصة التي تم إنشاؤها في يونيو/حزيران 2017 أول وحداتها التعليمية حول كوفيد-19 في 28 يناير/كانون الثاني 2020؛ يرجى زيارة الموقع على [OpenWHO.org](https://OpenWHO.org).

### 3. الاحتياجات والمتطلبات العاجلة

- ضمان توفير إمداد ثابت من لقاحات كوفيد-19 عبر مبادرة كوفاكس والاتفاقيات الثنائية لضمان الحصول على مناعة كافية بين نسبة كبيرة من السكان المؤهلين لأخذ اللقاح في أقرب وقت ممكن.
- ضمان تزويد الجمهور بمعلومات يومية عن اللقاحات ومواقع التطعيم المتوفرة من خلال قنوات الإعلام المحلي الرسمية لتسهيل عملية التلقيح في البلاد.
- ضمان توفير فحوص RT-PCR عالية الجودة وبكميات وفيرة للمساعدة في تحديد الوضع الفعلي للمرض في البلاد.
- مواصلة حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لزيادة الإقبال على اللقاح.
- إعادة تقييم مرافق الرعاية الصحية لسد الثغرات المتعلقة بالمعدات وأداء العاملين في مجال الرعاية الصحية والتي تعتبر ضرورية لتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.
- البحث عن تمويل إضافي لدعم حملة التطعيم من خلال حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية ومن خلال التقييم المناسب والمراقبة الميدانية في الوقت المناسب.

### 4. التحديات

- الخطر المحتمل لوصول سلالات جديدة من كوفيد-19 مثل سلالة (سلالات) دلتا مما يتطلب المزيد من اليقظة.
- ارتفاع درجات الحرارة في الصيف ونقص إمدادات الطاقة اللازمة للحفاظ على متطلبات سلسلة التبريد وضمان تخزين اللقاحات بالشكل المناسب.
- مستويات التطعيم والإقبال المنخفضة على لقاح استرازينيكا مع زيادة التردد في أخذه.
- نقص اللقاحات في المرافق الصحية الرئيسية وضعف عملية طرح التطعيم.
- القيود المفروضة على التمويل اللازم لدعم التدخلات بشأن كوفيد-19 واستدامتها بما في ذلك حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية.

### 5. التوصيات

- توصي منظمة الصحة العالمية في العراق بما يأتي:
- تخصيص مراكز تطعيم ثابتة، يتم الإعلان عنها بشكل جيد في منصات التواصل الاجتماعي والمنصات المحلية، وإنشاء خط (خطوط) ساخنة لخدمة التلقيح لتسهيل عملية التسجيل وإعطاء اللقاح بشكل مباشر.
- ضمان الاستعداد المناسب للاستجابة لعودة ارتفاع عدد الحالات والمتوقع في الأشهر القليلة القادمة، بما في ذلك:
  - ✓ إعادة تفعيل الإغلاق الجزئي الذي يستهدف ساعات العمل في مراكز التسوق والمقاهي والمطاعم وغيرها من أماكن التجمعات الاجتماعية.
  - ✓ استخدام موسم الحج القادم لاستدعاء الفئات العمرية الكبيرة المؤهلة التي يخطط أصحابها للذهاب للحج و/ أو العمرة، لتسريع عملية التسجيل وأخذ لقاحاتهم.
  - ✓ حث المصابين بأمراض مزمنة على التطعيم، والاستفادة من بطاقات الأدوية السنوية التي يحملها هؤلاء الأشخاص وزيارتهم الشهرية إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية المحددة لهم للحصول على حصتهم من الأدوية المدعومة. يمكن تزويد مراكز الرعاية الصحية الأولية بكميات جزئية من اللقاحات لتنفيذ الإجراء المقترح.
  - ✓ إشراك وزارات مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في تنظيم عملية تسجيل اللقاح وطرحه بالإضافة إلى مهمة مراقبة التزام العامة بتدابير الوقاية التي تصدرها وزارة الصحة.
  - ✓ الاستفادة من الإعلانات التثقيفية حول توفر اللقاح والتسجيل في المراكز المخصصة في حالة تعذر التسجيل الإلكتروني من قبل جميع الفئات المستهدفة، أما خدمات الإخطار عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة فستتطلب موارد لا يمكن تحملها.
  - ✓ الاستثمار في الفرق الصحية المتنقلة والعيادات الصحية المتنقلة في المناطق النائية أو مخيمات النازحين، وإنشاء مراكز تطعيم مسائية في الأماكن العامة. فقد يؤدي هذا إلى زيادة التوعية والمشاركة المجتمعية لتشجيع السكان على الالتزام بتدابير الصحة العامة وأخذ لقاح كوفيد-19 والإقبال عليه.

- مواصلة التعاون مع وزارة الصحة والوزارات واللجان والجهات المعنية الأخرى لتعزيز حملات الإبلاغ عن المخاطر والتعبئة الاجتماعية والانخراط الإعلامي لتشجيع الناس على مواصلة ارتداء الكمامات، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، والتسجيل للحصول على التطعيم.
- إجراء المزيد من الفحوص، وتتبع المخالطين، والمراقبة النشطة التي تعتبر ضرورية للكشف عن الحالات المخفية والسلالات الجديدة وغيرها من المشكلات الصحية. وتعد هذه كذلك فرصة للسلطات الصحية والشركاء الداعمين لإعادة تقييم ملف المناعة، وهيكल الموارد الوبائية، ومحاولة سد الثغرات.
- الإدارة السليمة والكشف عن سلالة (سلالات) دلتا من كوفيد-19 من خلال المراقبة الصارمة للحدود وتتبع المخالطين بعناية.
- تنسيق إجراء دراسة مشتركة مع المؤسسات الأكاديمية بهدف تحديد الصورة المناعية لدى السكان والمساعدة في إبراز مدى فعالية اللقاح وسلسلة التبريد وأداء مقدمي اللقاح.

## 6. مساهمة شركاء المجموعة الصحية/ الشركاء:

- حتى تاريخ 7 يوليو/تموز 2021، ووفقاً للتقارير الأسبوعية الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول الأشخاص المعنيين، أبلغت الإحصاءات الخاصة بكوفيد-19 بين النازحين داخلياً واللاجئين عن المعلومات التالية:
  - إجمالي عدد حالات الإصابة: 1,008 (483 لاجئ + 525 نازح داخلياً)
  - عدد الوفيات: 71
  - عدد حالات الشفاء: 816
  - عدد الحالات النشطة: 24
  - النتيجة غير معروفة: 97
- عقدت مجموعة الصحة العالمية اجتماعاً عبر الإنترنت مع مجموعة النظراء المعنية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي التابعة لفريق العمل الخاص بكوفيد-19 في 7 يوليو/تموز لعرض النتائج الموجزة من مسودة التقرير "المراجعة المكتبية: كوفيد-19 والعوائق التي تقف حائلاً أمام الخدمات الصحية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في الأوضاع الإنسانية: كوكس بازار والعراق وشمال شرق نيجيريا. كانت مبادرة READY، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، المساهمين الرئيسيين في إعداد هذا العمل الذي حضرته مجموعة الصحة العراقية.

نشكر شركاء منظمة الصحة العالمية في العراق على مساهماتهم السخية في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في العراق، وهم:



لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

السيدة أجيال سلطاني، مسؤولة اتصالات، هاتف: +9647740892878، بريد إلكتروني: [sultanya@who.int](mailto:sultanya@who.int)  
 د. وليد حتاحت، رئيس فريق الطوارئ في المنظمة هاتف: +9647729814999، بريد إلكتروني: [hatahitw@who.int](mailto:hatahitw@who.int)  
 السيدة بولين أجيلو، مسؤولة اتصال، هاتف: +96477729877288، بريد إلكتروني: [ajellopa@who.int](mailto:ajellopa@who.int)