



World Health Organization

تقرير الحالة الأسبوعي (الأسبوع 33)
16 - 22 أغسطس/آب 2021

مرض فيروس كورونا
(كوفيد-19)

المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية
في العراق

عدد الوفيات



20,184

عدد حالات الشفاء



1,659,168

عدد الحالات المؤكدة



1,825,089

عدد الحالات النشطة



145,737

عدد الفحوص



13,998,326

النقاط الرئيسية:

1. أبلغت مصادر وزارة الصحة عن إجمالي 49,325 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 هذا الأسبوع، مع 63,118 حالة شفاء و512 حالة وفاة متصلة بالمرض. وأشارت المصادر كذلك إلى إعطاء 3,486,632 جرعة لقاح في جميع أنحاء العراق هذا الأسبوع، ما يعني أن 10% من السكان المستهدفين في العراق قد حصلوا حتى الآن على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19.
2. عادت العدوى المجتمعية هذا الأسبوع إلى مستوى العدوى الشديدة بعد 4 أسابيع متعاقبة من استقرارها في المنطقة الحمراء/مستوى العدوى عالية الخطورة في البلاد.
3. بلغ متوسط عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات في الأسبوع (33) 3,355 مريضاً يومياً مع معدل إماتة في المستشفيات بلغ 2.2%.
4. كشفت بيانات التلقيح، حتى الآن، عن إعطاء 702,043 جرعة من لقاح استرازينيكا، و2,247,837 جرعة من لقاح فايزر، و746,711 جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.
5. تواصل منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية الوطنية حملاتها الميدانية وعبر الانترنت للوقاية من كوفيد-19 والترويج للتطعيم، وحث السكان، سواء كانوا مصابين بالمرض أم لا، على اتخاذ الاحتياطات الواجبة بما في ذلك التباعد الجسدي، ونظافة اليدين والنظافة التنفسية، وارتداء الكمامات، وضمان توفير التهوية الكافية لمنع الإصابة بكوفيد-19 أو انتشاره.

ملاحظات للقراء:

(1) مصدر البيانات الواردة في تقرير الحالة هنا هو نظام الإيلاغ اليومي لوزارة الصحة العراقية.

(2) يمكن الحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية من خلال لوحة المعلومات التفاعلية لدى منظمة الصحة العالمية في العراق: <https://bit.ly/2SINwLk>

التجمعات الحاشدة وكوفيد-19


إذا كان عليكم حضور تجمع، فالتزموا بإجراءات الوقاية، حتى وإن تلقيتم التطعيم بالفعل:

- حافظوا على مسافة لا تقل عن متر واحد بينكم وبين الآخرين.
- ارتدوا الكمامات.
- تجنبوا المناطق المزدحمة أو ذات التهوية السيئة.
- غطوا الفم والأنف عند السعال وإلغطس بثني المرفق أو بمناديل.
- نظفوا أيديكم باستمرار.



التجمعات الحاشدة وكوفيد-19

في سياق كوفيد-19، لا يندعم الخطر عندما يتعلق الأمر بأي نوع من أنواع التجمعات - خاصة الفعاليات التي تجتمع فيها مجموعات كبيرة من الناس في وقت واحد.




#كوفيد_19
#فيروس_كورونا

منظمة
الصحة العالمية
المكتب الإقليمي لشرق المتوسط


1. الحالة الوبائية للمرض في الأسبوع 33 (16 - 22 أغسطس/آب 2021)

- بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بكوفيد-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع 49,325، ما يمثل انخفاضاً قدره 13,730 حالة مقارنة بالأسبوع 32، بمعدل 119 حالة لكل 100 ألف من السكان، ما يمثل تغيراً بنسبة (-27%).




الشكل 1: المنحنى الوبائي للمرض في العراق خلال الأسبوع 33، 2021

- تم فحص 168,489 حالة يشتبه إصابتها بكوفيد-19 في الفترة ما بين 16-22 أغسطس/آب 2021، ما يعكس انخفاضاً بمقدار 35,053 حالة مقارنة بالأسبوع 32. ويمثل الانخفاض الحالي 6,118 فحصاً لكل 1 مليون من السكان، ما يمثل تغيراً بنسبة (-14%).




الشكل 2: فحوص RT-PCR حسب الأسابيع في العراق - الأسبوع 33، 2021

- بلغ معدل الإيجابية 20% في الأسبوع (33)، أي أقل بنقطتين من المعدل المسجل في الأسبوع 32. والمحافظات التي سجلت أعلى معدل إيجابية لهذا الأسبوع هي ميسان 35% وكربلاء 33% والبصرة 28.7%. بالمقابل، تواصل الأنبار تسجيل أدنى معدل للإيجابية عند 7.7%، ودهوك وإربيل عند 9.8 و 10.2% على التوالي.




الشكل 3: معدل الإيجابية في العراق - الأسبوع 33، 2021

- تم الإبلاغ عن 512 حالة وفاة متصلة بالمرض هذا الأسبوع، ما يرفع معدل الإماتة إلى 1.0%.




الشكل 4: توزيع حالات الوفاة الناجمة عن كوفيد-19 حسب الأسابيع في العراق - الأسبوع 33، 2021

- بلغ متوسط عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات هذا الأسبوع 3,355 مريضاً يومياً، و34% منهم في حالة خطيرة، و20% تتم معالجتهم في وحدة العناية المركزة، و69% تقريباً بحاجة إلى الأكسجين. وبلغ معدل الإماتة في المستشفيات هذا الأسبوع 2.2%.



الشكل 5: متوسط عدد مرضى كوفيد-19 المعالجين في المستشفيات ووحدة العناية المركزة والحاصلين على الأكسجين حسب الأسابيع - الأسبوع 33، 2021

- الفئات العمرية الأكثر تضرراً هذا الأسبوع هي الفئة العمرية (الأعلى من 15-45 سنة) بمعدل 61%، والفئة العمرية (الأعلى من 45-65 سنة)، بمعدل 26%. أما بالنسبة للوفيات، فقد سجلت أعلى نسبة وفيات هذا الأسبوع بين الفئات العمرية (الأعلى من 65 سنة) بمعدل 49%، تليها الفئة العمرية (الأعلى من 45-65 سنة) بمعدل 39%. يشير توزيع حالات الإصابة والوفاة بين الذكور والإناث إلى 1.4 و 1.5 على التوالي.



الشكل 6: التوزيع الجنساني لحالات الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 حسب الفئة العمرية والنوع الاجتماعي في العراق - الأسبوع 33، 2021

2. المؤشرات الوبائية للأسبوع 33:

عادت العدوى المجتمعية في الأسبوع 33 إلى مستويات العدوى الشديدة بعد أربعة أسابيع من استقرارها عند المنطقة الحمراء عالية الخطورة. وسجلت المستويات الأعلى في السلیمانية والبصرة وميسان وواسط وديالى وكركوك وكربلاء (الأحمر)، في الوقت الذي كانت فيه متوسطة (الأصفر) في الأنبار وفقاً لثلاثة مؤشرات وبائية رئيسية هي **مؤشرات الإصابات والوفيات ومعدل الإيجابية**.

المحافظة	حالة بين كل 100 ألف	وفاة بين كل 1 مليون	معدل الإيجابية	حالة بين كل 100 ألف	وفاة بين كل 1 مليون	معدل الإيجابية	المجموع 1	المجموع 2	المجموع 3	المجموع العام	المستوى
الأنبار	25.1	0.5	7.7	متوسطة	متخفضة	متوسطة	2	1	2	5	متوسطة
بابل	52.7	12.6	12.8	شديدة	شديدة	شديدة	3	3	3	9	شديدة
بغداد	122.8	8.8	20.5	عالية	متوسطة	عالية	4	2	4	10	شديدة
البصرة	152.9	10.2	28.7	عالية	شديدة	عالية	4	3	4	11	عالية
دهوك	231.8	37.2	9.8	عالية	شديدة	متوسطة	4	3	2	9	شديدة
الديوانية	114.3	7.9	24.1	عالية	متوسطة	عالية	4	2	4	10	شديدة
ديالى	107.7	11.3	25.6	عالية	شديدة	عالية	4	3	4	11	عالية
إربيل	154.5	28.9	10.2	عالية	شديدة	شديدة	4	3	3	10	شديدة
كربلاء	146.3	20.5	31.1	عالية	شديدة	عالية	4	3	4	11	عالية
كركوك	119.2	13.3	22.2	عالية	شديدة	عالية	4	3	4	11	عالية
ميسان	203.9	19.1	35	عالية	شديدة	عالية	4	3	4	11	عالية
المنجى	44.5	0	22	متوسطة	متخفضة	عالية	2	1	4	7	شديدة
التنجف	70.4	6.3	19.5	شديدة	متوسطة	شديدة	3	2	3	8	شديدة
نينوى	57.9	4.7	22.8	شديدة	متخفضة	عالية	3	1	4	8	شديدة
صلاح الدين	91.5	8.7	19.8	شديدة	متوسطة	شديدة	3	2	3	8	شديدة
السلیمانية	243	22.2	25.8	عالية	شديدة	عالية	4	3	4	11	عالية
ذي قار	90.7	18.6	24.7	شديدة	شديدة	عالية	3	3	4	10	شديدة
واسط	178.4	14.8	24.5	عالية	شديدة	عالية	4	3	4	11	عالية


جدول 1: العدوى المجتمعية بكوفيد-19 في العراق في الأسبوع 33، 2021

3. تأهب واستجابة منظمة الصحة العالمية:


أ) حملة التطعيم ضد كوفيد-19:

- حتى تاريخ 22 أغسطس/تموز 2021، تم إعطاء ما مجموعه *3,486,632 جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد، ما يشير إلى أن 10% من السكان المستهدفين في العراق قد تلقوا حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19. وأشارت البيانات المعلنة أيضاً أن 2,322,084 من السكان المستهدفين على الأقل قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تم تحصين 1,164,548 تحصيماً كاملاً بكلتا الجرعتين.
- كشفت إحصائيات إعطاء اللقاح في الأسبوع 33 أن 1,513,182 (65%) من الذكور قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح مقابل 801,812 (35%) من الإناث. فيما حصل 755,835 (65%) من الذكور على الجرعة الثانية مقابل 406,299 (35%) من الإناث. وما يزال الاقبال على اللقاح منخفضاً بين النساء مقابل الرجال لأسباب عديدة، وقد يكون ذلك مرتبطاً بميل الإناث إلى البقاء في المنزل لرعاية أسرهن بالإضافة إلى الشائعات حول الآثار الجانبية للقاح.
- يشير تحليل بيانات بدء التطعيم أن 931,747 (27%) من المجموعات ذات الأولوية التي تم تلقيحها تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، تليها 2,554,885 (73%) من الفئة العمرية 18-50 عاماً.

- تشمل المحافظات التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم باستخدام الجرعة الأولى بغداد - الكرخ بمعدل 362,977 (17.4%)، تليها دهوك (14.6%)، النجف (14.0%)، والبصرة (13.2%)، وكركوك (13.0%)، وديالى (12.1%)، وذي قار (11.1%). من ناحية أخرى، سُجل أقل عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم خلال الأسبوع 33 في السليمانية بمعدل (3.5%)، وصلاح الدين (6.2%)، وبغداد - الرصافة (7.0%).



الشكل 7: التطعيم في العراق حسب الأشهر - 2021



الشكل 8: إحصائيات التطعيم في العراق حسب نوع اللقاح - الأسبوع 33، 2021

ملاحظة: وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة هذا الأسبوع، بلغ إجمالي عدد الجرعات المقدمة للسكان في العراق *3,486,632 جرعة. ويمثل هذا الرقم عدد الجرعات الذي تبلغ عنه يوماً دوائر الصحة في جميع المحافظات. ولكن، تجدر الإشارة إلى أن التقارير المتعمقة الواردة من النظام الوطني تستغرق عادة بضعة أيام حتى يتم الانتهاء من إعدادها، ما يفسر الاختلاف في الأرقام بين الإحصائيات داخل لوحة المعلومات التفاعلية لمنظمة الصحة العالمية والأرقام اليومية التي تبلغ عنها وزارة الصحة.

(ب) تنسيق أنشطة كوفيد-19 مع السلطات الصحية المحلية:



صورة 1: منظمة الصحة تزور موقع الحجر الصحي/العزل الجديد في مخيم باجد كندا-2 للنزوحين داخلياً بمحافظة دهوك، أغسطس/آب 2021 منظمة الصحة العالمية في العراق


زار الفريق الفني التابع لمكتب تنسيق منظمة الصحة العالمية في دهوك موقع الحجر الصحي/العزل في مخيم باجد كندا-2 للنزوحين داخلياً في قضاء سميل بمحافظة دهوك. ويعد الموقع الجديد جزءاً من مشروع يتضمن إنشاء ثلاثة مواقع للحجر الصحي/العزل في المحافظة بتنفيذ مباشر من قبل صندوق التمويل الإنساني للعراق، بالشراكة مع مجموعة الصحة، وبرنامج المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وتنسيق وإدارة المخيمات، ومجموعة المأوى/المواد غير الغذائية. يسعى المشروع إلى تعزيز الاستجابة لكوفيد-19 في مخيمات النزوحين داخلياً بالمحافظة، ومن المتوقع أن تفتح المواقع أبوابها أمام المرضى في سبتمبر/أيلول هذا العام. وستضم المواقع في صفوفها مجموعة من الكوادر الصحية الخيرة لتقديم خدمات الطوارئ وخدمات الرعاية الصحية المنقذة للحياة للفئات الضعيفة من السكان في المحافظة.



صورة 2: جانب من حملة التوعية بالتطعيم التي تقوم بها منظمة الصحة العالمية ودائرة صحة السليمانية، أغسطس/آب 2021 منظمة الصحة العالمية في العراق

أبلغت دائرة صحة السليمانية مكتب تنسيق منظمة الصحة العالمية بالمحافظة عن زيادة عدد الأشخاص المطعمين ضد كوفيد-19 خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس/آب، وتزامنت تلك الزيادة مع زيادة في عدد مراكز التطعيم، والتي ارتفعت من 34 إلى 57 موقعاً. كما أبلغت دائرة صحة السليمانية عن نيتها فتح مراكز تطعيم جديدة في الأقسية الفرعية بالمحافظة.

(ت) الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية:



i. إدارة الخرافات والمعلومات الخاطئة: أنشأ مقر منظمة الصحة العالمية مركزاً لإدارة المعلومات يمكن الوصول إليه من خلال التفاصيل الواردة في المربع الإعلاني أدناه: (المزيد من المعلومات حول الدعوة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية للعمل وكيف تصبح أحد الموقعين، انقر هنا).



ii. التعلم الصحي عبر الإنترنت: وسعت منظمة الصحة العالمية نطاق الوصول إلى التعلم عبر الإنترنت من خلال إنشاء منصة تعليمية مفتوحة حول كوفيد-19 وحالات الطوارئ الصحية الأخرى. ونشرت المنصة التي تم إنشاؤها في يونيو/حزيران 2017 أول وحداتها التعليمية حول كوفيد-19 في 28 يناير/كانون الثاني 2020؛ يرجى زيارة الموقع على OpenWHO.org.

4. الاحتياجات والمتطلبات العاجلة

- أظهرت المؤشرات الوبائية عودة المرض في العراق إلى مستوى العدوى الشديدة بعد أربعة أسابيع من استقرارها عند المنطقة الحمراء عالية الخطورة، الأمر الذي يستلزم المزيد من التأكيد على أهمية الوقاية وارتداء الكمامات والتطعيم في المجتمعات الضعيفة على وجه التحديد.
- ضمان توفير إمداد ثابت من لقاحات كوفيد-19 عبر مبادرة كوفاكس والاتفاقيات الثنائية لضمان الحصول على مناعة كافية بين نسبة كبيرة من السكان المؤهلين لأخذ اللقاح في أقرب وقت ممكن.
- ضمان تزويد الجمهور بمعلومات يومية عن اللقاحات ومواقع التطعيم المتوفرة من خلال قنوات الإعلام المحلي الرسمية لتسهيل عملية التلقيح في البلاد.
- ضمان توفير فحوص RT-PCR عالية الجودة وبكميات وفيرة للمساعدة في تحديد الوضع الفعلي للمرض في البلاد.
- مواصلة حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لزيادة الإقبال على اللقاح.
- إعادة تقييم مرافق الرعاية الصحية لسد الثغرات المتعلقة بالمعدات وأداء العاملين في مجال الرعاية الصحية والتي تعتبر ضرورية لتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.
- السعي للحصول على تمويل إضافي لدعم حملة التطعيم من خلال حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية ومن خلال التقييم المناسب والمراقبة الميدانية في الوقت المناسب.

5. التحديات

- الانتشار المتسارع لمتحور دلتا.
- نقص اللقاحات في المرافق الصحية الرئيسية وضعف عملية إعطاء اللقاحات.
- ضرورة الحفاظ على متطلبات سلسلة التبريد في مواقع التطعيم وضمان تخزين اللقاحات بالشكل المناسب.
- الإقبال المنخفض نسبياً على اللقاح لا سيما في المناطق الفقيرة، والريفية، والنائية والضواحي.
- القيود المفروضة على التمويل اللازم لدعم التدخلات بشأن كوفيد-19 واستدامتها بما في ذلك حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية.

6. التوصيات

- توصي منظمة الصحة العالمية في العراق بما يأتي:
- تثقيف العامة بشأن المخاطر المحتملة لتفشي كوفيد-19 في حال استمرار التجمعات الاجتماعية والدينية دون التقيد الصارم بالتدابير الوقائية الأساسية.
- تخصيص مراكز تطعيم ثابتة، يتم الإعلان عنها بشكل جيد في منصات التواصل الاجتماعي والمنصات المحلية، وإنشاء خط (خطوط) ساخنة لخدمة التلقيح لتسهيل عملية التسجيل وإعطاء اللقاح بشكل مباشر.
- ضمان الاستعداد المناسب للاستجابة لعودة ارتفاع عدد الحالات والمتوقع في الأشهر القليلة القادمة، بما في ذلك:
 - ✓ استخدام "العيادات الشعبية" المسائية في مراكز الرعاية الصحية الأولية المخصصة في جميع المحافظات لاستهداف مجموعات المرضى المسجلين، المصابين بأمراض قديمة ومزمنة، للحصول على حصتهم من الأدوية المدعومة التي يتم صرفها شهرياً. وقد يسرع استخدام هذه الخدمة المنظمة جيداً لإعطاء اللقاح، عملية تطعيم السكان.
 - ✓ إشراك وزارات مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في تنظيم عملية تسجيل اللقاح وطرحه بالإضافة إلى مهمة مراقبة التزام العامة بتدابير الوقاية التي تصدرها وزارة الصحة.
 - ✓ الاستفادة من الإعلانات التثقيفية حول توفر اللقاح والتسجيل في المراكز المخصصة في حالة تعذر التسجيل الإلكتروني من قبل جميع الفئات المستهدفة، أما خدمات الإخطار عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة فستتطلب موارد لا يمكن تحملها.
 - ✓ الاستثمار في الفرق الصحية المتنقلة والعيادات الصحية المتنقلة في المناطق النائية أو مخيمات النازحين، وإنشاء مراكز تطعيم مسائية في الأماكن العامة. فقد يؤدي هذا إلى زيادة التوعية والمشاركة المجتمعية لتشجيع السكان على الالتزام بتدابير الصحة العامة وأخذ لقاح كوفيد-19 والإقبال عليه.
- مواصلة التعاون مع وزارة الصحة والوزارات واللجان والجهات المعنية الأخرى لتعزيز حملات الإبلاغ عن المخاطر والتعبئة الاجتماعية والانخراط الإعلامي مع التركيز على ارتداء الكمامات، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، والتسجيل للحصول على التطعيم.
- إجراء المزيد من الفحوص، وتتبع المخالطين، والمراقبة النشطة التي تعتبر ضرورية للكشف عن الحالات المخفية والسلالات الجديدة وغيرها من المشكلات الصحية. وتعد هذه كذلك فرصة للسلطات الصحية والشركاء الداعمين لإعادة تقييم ملف المناعة، وهيكल الموارد الوبائية، ومحاولة سد الثغرات.

- تنسيق إجراء دراسة مشتركة مع المؤسسات الأكاديمية بهدف تحديد الصورة المناعية لدى السكان والمساعدة في إبراز مدى فعالية اللقاح وسلسلة التبريد وأداء مقدمي اللقاح.

7. مساهمة شركاء المجموعة الصحية/ الشركاء:

- حتى تاريخ 18 أغسطس/آب 2021، ووفقاً للتقارير الأسبوعية الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول الأشخاص المعنيين، أبلغت الإحصاءات الخاصة بكوفيد-19 بين النازحين داخلياً واللاجئين عن المعلومات التالية:

- إجمالي عدد حالات الإصابة: 1,615 (759 لاجئ + 856 نازح داخلياً)
- عدد الوفيات: 87
- عدد حالات الشفاء: 1,006
- عدد الحالات النشطة: 425
- النتيجة غير معروفة: 97

- تعكف وزارة الصحة والجمعية الأهلية حالياً على وضع بطاقات تطعيم جديدة مقبولة دولياً برموز QR، ومن المقرر أن تكون تلك البطاقات متوفرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021. من الجدير بالذكر أن بطاقات التطعيم الأمامية لم تقبل بعد في دول أخرى. لذلك، تجري مناقشات بين بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومنظمة الصحة العالمية للتنسيق المباشر مع وزارة الصحة لتزويد عيادات التطعيم التابعة للأمم المتحدة ببطاقة QR.

- أصدر القضاء العراقي هذا الأسبوع بياناً رسمياً تناول التأثير الخطير للتضليل على وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقاً للبيان، فإن أي شخص ينشر معلومات مضللة عن كوفيد-19 واللقاحات سيتم اعتقاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

نشكر شركاء منظمة الصحة العالمية في العراق على مساهماتهم السخية في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في العراق، وهم:

