



تقرير الحالة الأسبوعي (الأسبوع 30)
26 يوليو/تموز - 1 أغسطس/آب 2021

مرض فيروس كورونا
(كوفيد-19)

المكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية
في العراق

عدد الوفيات



18,734

عدد حالات الشفاء



1,472,093

عدد الحالات المؤكدة



1,635,993

عدد الحالات النشطة



145,166

عدد الفحوص



13,122,716

النقاط الرئيسية:

1. من المقرر أن يتسلم العراق نصف مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر تبرعت بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المتوقع أن تصل هذه الشحنة إلى البلاد في التاسع من الشهر الحالي.
2. أبلغت مصادر وزارة الصحة عن إجمالي **83,345** حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 هذا الأسبوع، ما يمثل **202** حالة إصابة لكل 100 ألف من السكان. وبلغ عدد الوفيات الجديدة المتصلة بكوفيد-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع **447** حالة، مع معدل إماتة حالات **0.5%**.
3. لا تزال العدوى المجتمعية في الأسبوع 30 منتشرة بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد، حيث تم تسجيل ارتفاع مثير للقلق في معدلات الإصابة في 10 محافظات على وجه التحديد، بينما سجلت المحافظات الثماني المتبقية مستوى "العدوى المجتمعية الشديدة".
4. بلغ متوسط عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات في الأسبوع (30) **3334** مريضاً يومياً، مع معدل إماتة في المستشفيات بلغ **1.9%**.
5. تم إعطاء إجمالي **2,077,258*** جرعة لقاح في جميع أنحاء العراق هذا الأسبوع، ما يعني أن **8.9%** من السكان المستهدفين في العراق قد حصلوا حتى الآن على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19.
6. كشفت بيانات التلقيح، حتى الآن، عن إعطاء **614,137** جرعة من لقاح استرازينيكا، و **968,675** جرعة من لقاح فايزر، و **494,446** جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.


ملاحظات للقراء:

- (1) مصدر البيانات الواردة في تقرير الحالة هذا هو نظام الإبلاغ اليومي لوزارة الصحة العراقية.
- (2) يمكن الحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية من خلال لوحة المعلومات التفاعلية لدى منظمة الصحة العالمية في العراق: <https://bit.ly/2SiNwIk>




1. الحالة الوبائية للمرض في الأسبوع 30، (26 يوليو/تموز - 01 أغسطس/آب 2021)

- بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بكوفيد-19 المبلغ عنها هذا الأسبوع 83,345، ما يمثل زيادة قدرها 22,409 حالة مقارنة بالأسبوع 29، بمعدل 202 حالة لكل 100 ألف من السكان.




الشكل 1: المنحنى الوبائي للمرض في العراق خلال الأسبوع 30، 2021

- بلغ إجمالي عدد فحوص RT-PCR التي أجريت خلال الأسبوع (30) 369,441 فحصاً، ما يعكس زيادة قدرها 123,134 فحصاً مقارنة بالأسبوع 29، بمعدل 8,969 فحصاً لكل مليون من السكان.




الشكل 2: فحوص RT-PCR في العراق في الأسبوع 30، 2021

- لا يزال معدل الإيجابية في الأسبوع 30 يشير إلى ارتفاع في عدد الحالات المبلغ عنها، ليقف عند 23% بانخفاض قدره 2% مقارنة بالأسبوع 29. ويعود ذلك إلى زيادة في عدد فحوصات PCR التي أجريت هذا الأسبوع. والمحافظات التي سجلت أعلى معدل إيجابية لهذا الأسبوع هي كربلاء 45% وميسان 36% والبصرة 32%. بالمقابل، تم تسجيل أدنى معدل في الأنبار وأربيل عند 15%.




الشكل 3: معدل الإيجابية في العراق - الأسبوع 30، 2021

- بلغ عدد حالات الوفاة المتصلة بالمرض هذا الأسبوع 447 حالة، ما يمثل انخفاضاً قدره 10 حالات وفاة مقارنة بالأسبوع الماضي. وبلغ معدل إماتة الحالات 0.5%.




الشكل 4: توزيع حالات الوفاة الناجمة عن كوفيد-19 حسب الأسبوع في العراق - الأسبوع 30، 2021

- بلغ عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات هذا الأسبوع 23,339 مريضاً، و7,538 منهم في حالة خطيرة، و15,829 يتم دعمهم بالأكسجين، و5039 تتم معالجتهم في وحدة العناية المركزة. وبلغ معدل الإماتة في المستشفيات هذا الأسبوع 1.9%.



الشكل 5: متوسط عدد مرضى كوفيد-19 المعالجين في المستشفيات ووحدة العناية المركزة حسب الأسابيع - الأسبوع 30، 2021

الفئات العمرية الأكثر تضرراً هذا الأسبوع هي الفئة العمرية (الأعلى من 15-45 سنة)، والفئة العمرية (الأعلى من 45-65 سنة)، بمعدل 59% و25% على التوالي. أما بالنسبة للوفيات، فقد سجلت أعلى نسبة وفيات بين الفئات العمرية (الأعلى من 45-65 سنة) و(الأعلى من 65 سنة)، بمعدل 38% و51% على التوالي. يشير توزيع حالات الإصابة والوفاة بين الذكور والإناث في الأسبوع 30 إلى 1.4 و1.6 على التوالي.



الشكل 6: توزيع حالات الوفاة الناجمة عن كوفيد-19 حسب الفئات العمرية والنوع الاجتماعي في العراق - الأسبوع 30، 2021

2. المؤشرات الوبائية للأسبوع 30:

خلال الأسبوع 30، استمرت العدوى المجتمعية بالانتشار بشكل كبير في العراق، ما جعل البلاد بأكملها في المنطقة الحمراء عالية الخطورة. وسجلت المستويات الأعلى في دهوك وواسط، في الوقت الذي كانت فيه العدوى المجتمعية متوسطة في الأنبار وبابل ونيوى وفقاً لثلاثة مؤشرات وبائية رئيسية هي مؤشرات الإصابات والوفيات ومعدل الإيجابية.

العدوى المجتمعية حسب ملغيات الصحة في العراق في الأسبوع 30											
دخلت 10 محافظات المنطقة الحمراء عالية الخطورة وانتقلت الأنبار من متوسطة إلى شديدة											
المحافظات	حالة بين كل 100 ألف	وفاة بين كل 1 مليون	معدل الإيجابية	حالة بين كل 100 ألف	وفاة بين كل 1 مليون	معدل الإيجابية	معدل الإيجابية	المجموع 1	المجموع 2	المجموع 3	المجموع العام
الأنبار	57.9	1.6	14.6	شديدة	متخفضة	شديدة	شديدة	3	1	3	7
بابل	98.5	10.3	19.7	شديدة	شديدة	شديدة	شديدة	3	3	3	9
بغداد	223.8	8.8	22.7	عالية	متوسطة	عالية	عالية	4	2	4	10
البصرة	219.6	6.4	32.2	عالية	متوسطة	عالية	عالية	4	2	4	10
دهوك	665.8	37.2	16.8	عالية جداً	شديدة	شديدة	شديدة	5	3	3	11
الديوانية	147.5	19.4	21.7	عالية	شديدة	عالية	عالية	4	3	4	11
ديالى	129.2	5.7	32.4	عالية	متوسطة	عالية	عالية	4	2	4	10
إربيل	251.6	14.0	14.9	عالية	شديدة	شديدة	شديدة	4	3	3	10
كربلاء	272.3	12.9	44.6	عالية	شديدة	عالية	عالية	4	3	4	11
كركوك	113.5	16.2	20.9	عالية	شديدة	عالية	عالية	4	3	4	11
ميسان	227.1	20.0	35.8	عالية	شديدة	عالية	عالية	4	3	4	11
المتن	131.6	13.7	30.0	عالية	شديدة	عالية	عالية	4	3	4	11
النجف	141.4	13.8	21.8	عالية	شديدة	عالية	عالية	4	3	4	11
نيوى	76.6	3.0	18.2	شديدة	متخفضة	شديدة	شديدة	3	1	3	7
صلاح الدين	110.6	4.1	18.1	عالية	متخفضة	شديدة	شديدة	4	1	4	8
السليمانية	258.0	13.3	21.1	عالية	شديدة	عالية	عالية	4	3	4	11
ذي قار	274.7	16.3	29.6	عالية	شديدة	عالية	عالية	4	3	4	11
واسط	353.9	6.7	30.1	عالية جداً	متوسطة	عالية	عالية	5	2	4	11


جدول 1: العدوى المجتمعية بكوفيد-19 في العراق في الأسبوع 30، 2021

3. تأهب واستجابة منظمة الصحة العالمية:

أ) حملة التطعيم ضد كوفيد-19:

- حتى الأسبوع 30، تم إعطاء إجمالي **2,077,258*** جرعة لقاح في جميع أنحاء البلاد، ما يعني أن **8.9%** من السكان المستهدفين في العراق قد حصلوا حتى الآن على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19. تشير البيانات المبلغ عنها أيضاً أن **1,522,014** من السكان المستهدفين على الأقل قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تم تحصين **723,164** تحصيماً كاملاً بكلتا الجرعتين.
- كشفت إحصائيات إعطاء اللقاح في الأسبوع 30 أن **924,694 (67%)** من الذكور قد حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح مقابل **457,041 (33%)** من الإناث. فيما حصل **445,347 (65%)** من الذكور على الجرعة الثانية مقابل **240,690 (35%)** من الإناث. وما يزال الاقبال على اللقاح منخفضاً بين النساء مقابل الرجال، وقد يكون ذلك مرتبطاً بميل الإناث إلى البقاء في المنزل لرعاية أسرهن بالإضافة إلى الشائعات حول الآثار الجانبية للقاح.
- يشير تحليل بيانات بدء التطعيم أن **570,802 (27%)** من المجموعات ذات الأولوية التي تم تلقئها تزيد أعمارهم عن **50** عاماً، تليها **1,506,516 (73%)** من الفئة العمرية **18-50** عاماً.
- تشمل المحافظات التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم باستخدام الجرعة الأولى بغداد - الكرخ بمعدل **220,011 (10.6%)**، تليها النجف **(9.7%)**، والبصرة **(7.7%)**، وكركوك **(7.4%)**، وذي قار **(7.2%)**، وكربلاء

(7.1%) وبابل (6.8%). من ناحية أخرى، سُجل أقل عدد من الأشخاص الذين تم تطعيمهم خلال الأسبوع 30 في السليمانية بمعدل (1.8%)، وصلاح الدين (3.1%)، ونيوى (3.5%) وإربيل (3.6%).



الشكل 7: التطعيم في العراق حسب نوع اللقاح/الشهر - الأسبوع 30، 2021

ملاحظة: وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة هذا الأسبوع، بلغ إجمالي عدد الجرعات المقدمة للسكان في العراق 2,077,258* جرعة. ويمثل هذا الرقم عدد الجرعات الذي تبلغ عنه يوماً دوائر الصحة في جميع المحافظات. ولكن، تجدر الإشارة إلى أن التقارير المتعمقة الواردة من النظام الوطني تستغرق عادة بضعة أيام حتى يتم الانتهاء من إعدادها، ما يفسر الاختلاف في الأرقام بين الإحصائيات داخل لوحة المعلومات التفاعلية لمنظمة الصحة العالمية والأرقام اليومية التي تبلغ عنها وزارة الصحة.

تنسيق أنشطة كوفيد-19 مع السلطات الصحية المحلية:

- أجرى الفريق الفني لمنظمة الصحة العالمية في محافظة دهوك/إقليم كردستان زيارة تقييمية إلى موقع الحجر الصحي/العزل الذي يتم إنشاؤه حالياً لمرضى كوفيد-19 في مخيم شاريا للنازحين في دهوك. ويعد الموقع واحداً من ثلاثة مواقع للحجر الصحي/العزل يجري العمل على إنشائها حالياً في المحافظة (مخيم برسييف-2 ومخيم باجد كندال-1 للنازحين داخلياً). يُنفذ المشروع صندوق التمويل الإنساني للعراق، ويهتم بجوانب تهدف إلى تعزيز الاستجابة لكوفيد-19 في مخيمات النازحين، من بينها الصحة، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وتنسيق وإدارة المخيمات، ومجموعة المأوى، وذلك بالتنسيق مع مديرية صحة مع دهوك. ومن المقرر أن يفتح موقع شاريا أبوابه للمرضى في سبتمبر/أيلول 2021.



صورة 1: وحدة الحجر الصحي/العزل قيد الإنشاء في مخيم شاريا للنازحين داخلياً، دهوك - إقليم كردستان. الصورة: منظمة الصحة العالمية في العراق

ب) الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية:



i. إدارة الخرافات والمعلومات الخاطئة: أنشأ مقر منظمة الصحة العالمية مركزاً لإدارة المعلومات يمكن الوصول إليه من خلال التفاصيل الواردة في المربع الإعلاني أدناه:

(المزيد من المعلومات حول الدعوة التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية للعمل وكيف تصبح أحد الموقعين، انقر هنا).

ii. التعلم الصحي عبر الإنترنت: وسعت منظمة الصحة العالمية نطاق الوصول إلى التعلم عبر الإنترنت من خلال إنشاء منصة تعليمية مفتوحة حول كوفيد-19 وحالات الطوارئ الصحية الأخرى.

ونشرت المنصة التي تم إنشاؤها في يونيو/حزيران 2017 أول وحداتها التعليمية حول كوفيد-19 في 28 يناير/كانون الثاني 2020؛ يرجى زيارة الموقع على OpenWHO.org.

4. الاحتياجات والمتطلبات العاجلة

- تندر المؤشرات الوبائية إلى تدهور سريع في وضع المرض في العراق، الأمر الذي يستلزم المزيد من التأكيد على أهمية الوقاية وارتداء الكمامات والتطعيم في المجتمعات الضعيفة على وجه التحديد.
- ضمان توفير إمداد ثابت من لقاحات كوفيد-19 عبر مبادرة كوفاكس والاتفاقيات الثنائية لضمان الحصول على مناعة كافية بين نسبة كبيرة من السكان المؤهلين لأخذ اللقاح في أقرب وقت ممكن.
- ضمان تزويد الجمهور بمعلومات يومية عن اللقاحات ومواقع التطعيم المتوفرة من خلال قنوات الإعلام المحلي الرسمية لتسهيل عملية التلقيح في البلاد.
- ضمان توفير فحوص RT-PCR عالية الجودة وبكميات وفيرة للمساعدة في تحديد الوضع الفعلي للمرض في البلاد.
- مواصلة حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية لزيادة الإقبال على اللقاح.
- إعادة تقييم مرافق الرعاية الصحية لسد الثغرات المتعلقة بالمعدات وأداء العاملين في مجال الرعاية الصحية والتي تعتبر ضرورية لتحسين تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.
- السعي للحصول على تمويل إضافي لدعم حملة التطعيم من خلال حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية ومن خلال التقييم المناسب والمراقبة الميدانية في الوقت المناسب.

5. التحديات

- الانتشار الواسع لمتحور دلتا والارتفاع الكبير في عدد الحالات المبلغ عنها.
- نقص اللقاحات في المرافق الصحية الرئيسية وضعف عملية طرح التطعيم.
- ارتفاع درجة الحرارة في الصيف ونقص إمدادات الطاقة اللازمة للحفاظ على متطلبات سلسلة التبريد وضمان تخزين اللقاحات بالشكل المناسب.
- الإقبال المنخفض نسبياً على اللقاح لا سيما في المناطق الفقيرة والريفية والنائية والضواحي.
- القيود المفروضة على التمويل اللازم لدعم التدخلات بشأن كوفيد-19 واستدامتها بما في ذلك حملات الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية.

6. التوصيات

- توصي منظمة الصحة العالمية في العراق بما يأتي:
- تخصيص مراكز تطعيم ثابتة، يتم الإعلان عنها بشكل جيد في منصات التواصل الاجتماعي والمنصات المحلية، وإنشاء خط (خطوط) ساخنة لخدمة التلقيح لتسهيل عملية التسجيل وإعطاء اللقاح بشكل مباشر.
- ضمان الاستعداد المناسب للاستجابة لعودة ارتفاع عدد الحالات والمتوقع في الأشهر القليلة القادمة، بما في ذلك:
- ✓ إعادة تفعيل الإغلاق الجزئي الذي يستهدف ساعات العمل في مراكز التسوق والمقاهي والمطاعم وغيرها من أماكن التجمعات الاجتماعية.

- ✓ استخدام "العيادات الشعبية" المسائية في مراكز الرعاية الصحية الأولية المخصصة في جميع المحافظات لاستهداف مجموعات المرضى المسجلين، المصابين بأمراض قديمة ومزمنة، للحصول على حصتهم من الأدوية المدعومة التي يتم صرفها شهرياً. وقد يسرع استخدام هذه الخدمة المنظمة جيداً لإعطاء اللقاح، عملية تطعيم السكان.
- ✓ إشراك وزارات مثل وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في تنظيم عملية تسجيل اللقاح وطرحة بالإضافة إلى مهمة مراقبة التزام العامة بتدابير الوقاية التي تصدرها وزارة الصحة.
- ✓ الاستفادة من الإعلانات التثقيفية حول توفر اللقاح والتسجيل في المراكز المخصصة في حالة تعذر التسجيل الإلكتروني من قبل جميع الفئات المستهدفة، أما خدمات الإخطار عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة فستتطلب موارد لا يمكن تحملها.
- ✓ الاستثمار في الفرق الصحية المتنقلة والعيادات الصحية المتنقلة في المناطق النائية أو مخيمات النازحين، وإنشاء مراكز تطعيم مسائية في الأماكن العامة. فقد يؤدي هذا إلى زيادة التوعية والمشاركة المجتمعية لتشجيع السكان على الالتزام بتدابير الصحة العامة وأخذ لقاح كوفيد-19 والإقبال عليه.
- مواصلة التعاون مع وزارة الصحة والوزارات واللجان والجهات المعنية الأخرى لتعزيز حملات الإبلاغ عن المخاطر والتعبئة الاجتماعية والانخراط الإعلامي لتشجيع الناس على مواصلة ارتداء الكمامات، والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، والتسجيل للحصول على التطعيم.
- إجراء المزيد من الفحوص، وتتبع المخالطين، والمراقبة النشطة التي تعتبر ضرورية للكشف عن الحالات المخفية والسلالات الجديدة وغيرها من المشكلات الصحية. وتعد هذه كذلك فرصة للسلطات الصحية والشركاء الداعمين لإعادة تقييم ملف المناعة، وهيكل الموارد الوبائية، ومحاولة سد الثغرات.
- تنسيق إجراء دراسة مشتركة مع المؤسسات الأكاديمية بهدف تحديد الصورة المناعية لدى السكان والمساعدة في إبراز مدى فعالية اللقاح وسلسلة التبريد وأداء مقدي اللقاح.

7. مساهمة شركاء المجموعة الصحية/ الشركاء:

- حتى تاريخ 28 يوليو/تموز 2021، ووفقاً للتقارير الأسبوعية الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول الأشخاص المعنيين، أبلغت الإحصاءات الخاصة بكوفيد-19 بين النازحين داخلياً واللاجئين عن المعلومات التالية:
 - أ. إجمالي عدد حالات الإصابة: 1,179 (552 لاجئ + 627 نازح داخلياً)
 - ب. عدد الوفيات: 74
 - ت. عدد حالات الشفاء: 859
 - ث. عدد الحالات النشطة: 149
 - ج. النتيجة غير معروفة: 97

- في اجتماع المساءلة تجاه السكان المتضررين/التواصل مع المجتمعات الذي عقد في 29 يوليو/تموز، عرضت منظمة الصحة العالمية بالإجابة عن مجموعة العمل المعنية بالإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية وشركاء المجموعة الصحية، المستجبات التي طرأت بشأن الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية حول كوفيد-19، بالإضافة إلى موجز تضمن استطلاعات للرأي قام بها البنك الدولي ومنظمة إنترسوس حول نوايا التطعيم ضد المرض. وستتم مناقشة اقتراحات المشاركين وتوقعاتهم في الاجتماع التنسيق القادم.

نشكر شركاء منظمة الصحة العالمية في العراق على مساهماتهم السخية في الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في العراق، وهم:



لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ

السيدة أجيال سلطاني، مسؤولة اتصالات هاتف: +9647740892878، بريد إلكتروني: sultanya@who.int
د. وائل حتاحت، رئيس فريق الطوارئ في المنظمة هاتف: +9647729814999، بريد إلكتروني: hatahitw@who.int

السيدة بولين أجيلو، مسؤولة اتصالات، هاتف: +96477729877288، بريد إلكتروني: aiellopa@who.int