

طبّق

احتياطات مكافحة انتقال العدوى عن طريق الهواء

بالإضافة إلى الاحتياطات القياسية

في حالة المرضى الذين يُشتبه في إصابتهم أو تأكدت إصابتهم بعدوى تتسم بزيادة خطر انتقالها عن طريق الهواء



- العدوى المنقولة بالهواء (السل الرئوي والحصبة والجذري المائي).
- العدوى التي يمكن أن تنتقل عن طريق نويات رذاذية صغيرة جدًا تنتج عن القيام بالإجراءات التي ينتج عنها تناثر رذاذ (مثل كوفيد-19، وجذري القردة، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والإنفلونزا الموسمية، إلخ).

أحرص على تنظيف اليدين



- اغسل يديك بالماء والصابون أو افرّكهما بمطهر كحولي بناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية الخاصة باللحظات الخمس لنظافة اليدين


تأكد من وضع المريض في مكان مناسب




- ضع المريض في غرفة مخصصة لعزل المرضى المصابين بعدوى منقولة عن طريق الهواء (سالبة الضغط)، أو في غرفة فردية جيدة التهوية
- أحرص على إبقاء الباب مغلقًا

خصّص أدوات رعاية للمريض أو استخدم معدات أحادية الاستعمال

- نظّف وطهّر المعدات المشتركة والتي يمكن إعادة استخدامها قبل استخدامها مع مريض آخر



استخدم معدات الوقاية الشخصية بطريقة صحيحة



- ارتدِ قناعًا تنفسيًا عالي الكفاءة أو ما يعادله، وتحقق من إحكامه قبل دخول غرفة المريض
- أثناء القيام بالإجراءات التي ينتج عنها تناثر رذاذ، ارتدِ قفازات، وعباءة طبية طويلة الأكمام، وواقياً للعينين، بالإضافة إلى القناع التنفسي العالي الكفاءة
- اخلع معدات الوقاية الشخصية الملوثة، وتخلّص منها بشكل آمن قبل الخروج، ما عدا القناع التنفسي أخلعه بعد ترك غرفة المريض، ثم نظّف يديك

الحد من نقل المريض وقصره على الأغراض الطبية الضرورية

- عندما يكون نقل المريض ضروريًا، اطلب من المريض أن يرتدي كمامة طبية (إذا تحمل) وأن يتبع آداب التنفس والسعال.

