



Country reports

The World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, developed the Global Youth Tobacco Survey to track tobacco use among youth across countries using a common methodology and core questionnaire. Information from the Survey is compiled within the participating country by a Research Coordinator nominated by the Ministry of Health, and technically reviewed by WHO and CDC. The content has not otherwise been edited by WHO or CDC.

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this publication. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.



**World Health
Organization**

Regional Office for the Eastern Mediterranean



التقرير النهائي

المسح العالمي للتدخين
بين الشباب للفئة العمرية
(15 - 13) سنة

في الأردن

عام
2009

بالتعاون مع **CDC - WHO**



منظمة الصحة العالمية



الفهرس

رقم الصفحة

3	- المقدمة
5	- منهجية الدراسة
8	- النتائج
22	- المناقشة
26	- التوصيات

مقدمة :

يعتبر استهلاك التبغ أحد أهم أسباب الوفاة والمرض التي يمكن تجنبها في العالم، وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية بأن حوالي خمسة ملايين ونصف وفاة سنويًا لها علاقة مباشرة باستهلاك التبغ، ومن المتوقع أن يزيد عدد الوفيات إلى عشرة ملايين بحلول عام 2025 فيما لو بقيت الإجراءات المتبعة في مكافحة التدخين ضعيفة، علمًا بأن 70% من هذه الوفيات تحدث في الدول النامية .

يبدأ التدخين عادة في سن مبكرة وتشير الدلائل إلى أن شركات التبغ الكبرى تستهدف صغار السن من الأطفال والمرأهقين من الشباب وخاصة في الدول النامية التي تفتقر إلى التشريعات والقوانين ذات العلاقة بمكافحة التدخين وخاصة بين فئة الشباب وان وجدت فإنها غير مفعولة .

إن اهتمام المجتمع الدولي وعلى رأسه المنظمات الدولية وخاصة من خلال مبادرات التحرر من التبغ لمنظمة الصحة العالمية أو من خلال دعم برامج اليافعين والشباب لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومكتب التبغ والصحة بمركز مكافحة الأمراض وذلك بهدف الحد من وباء التدخين والذي يهدد حياة الملايين من البشر وخاصة الشباب على المستوى العالمي.

من المؤكد أن الأطفال والمرأهقين أكثر من ذي قبل تعرضاً لمخاطر التدخين بسبب وسائل الدعاية التي تبتكرها شركات التبغ بين الحين والآخر لتشجيع هذه الفئة للبدء بالتدخين.

من هنا يجب أن تحتل هذه الفئة الأولوية الرئيسية في الاستراتيجيات المستقبلية الهدافة لمكافحة استهلاك كافة مشتقات التبغ، الأمر الذي تطلب إجراء هذه الدراسة للتعرف على مواقف وسلوكيات الأطفال والمرأهقين حول استهلاك التبغ في الأردن ، وتقدير الوضع من خلال مقارنتها بالدراسات السابقة .

برنامج مكافحة التدخين في الأردن :

يحظى برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة باهتمام خاص، فقد استحدثت وزارة الصحة قسم خاص للوقاية من أضرار التدخين وافتتحت أول عيادة للاقلاع عن التدخين في عام 2003، وكانت الأردن من أوائل الدول في المنطقة التي أصدرت تشريعات للحد من انتشار ظاهرة التدخين وذلك من خلال قانون الصحة العامة رقم (47) لعام 2008، وإفراد فصلاً كاملاً لوقاية الصحة العامة من أضرار التدخين وهو الفصل الثاني عشر من القانون، والذي يتضمن :

1. منع التدخين في الأماكن العامة وتعریف المكان العام.
2. تغليظ العقوبات على التدخين في الأماكن العامة وخاصة الحضانات ورياض الأطفال .
3. عدم جواز طبع أو عرض أو نشر أي إعلان عن السجائر.
4. منع صنع أو بيع مقلدات التبغ في المملكة.
5. عدم بيع السجائر لأقل من 18 عاما.
6. إلزام شركات التبغ بوضع عبارة وصورة تحذر من مخاطر التدخين على علب السجائر (المواصفة القياسية الأردنية).

إضافة إلى أنه صدر قانون مراقبة سلوك الأحداث رقم 37 لعام 2006 والذي يحظر على الحدث بيع أو شراء أو تدخين السجائر أو النرجيلة أو غيرها من منتجات التبغ لأقل من 18 عاماً.

وقد كان الأردن من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ في عام 2004.

وصدر مؤخراً فرار من وزير الصحة بمنع التدخين في جميع مبانی ودوائر الوزارة، كما قامت وزارة الصحة أيضاً بالتعاون مع الجهات الوطنية الأخرى الحكومية وغير الحكومية والتطوعية ذات العلاقة بمكافحة التدخين وبدعم من المنظمات الدولية بوضع استراتيجية

وطنية لمكافحة التدخين وتشكيل اللجنة الوطنية للوقاية من اضرار التدخين .

أهداف الدراسة :

1. تحديد معدلات انتشار تدخين السجائر ومنتجات التبغ الأخرى بين الفئة العمرية 13-15 سنة .
2. تحديد معدلات انتشار الارجلية بين الشباب.
3. تحديد مدى احتواء المناهج الدراسية على موضوع التبغ ومكافحته .
4. تحديد معدل التوقف عن التدخين .
5. تقدير مدى التعرض للتدخين السلبي .
6. تحديد مدى المعرفة والاتجاهات حول استهلاك التبغ .
7. تحديد مدى التعرض للدعائية والترويج للتبغ .
8. تحديد مدى سهولة الحصول على التبغ .

منهجية الدراسة :

1. أسلوب الدراسة و اختيار العينة :

تمت الدراسة بأسلوب الدراسة المسحية الوصفية المقطعية وباستخدام الطريقة الطبقية على مرحلتين، بحيث تم اختيار عينة مماثلة من طلبة الصفوف الثامن – العاشر، ومن المدارس الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية .

وتم الحصول على المعلومات الخاصة بعدد الطلبة الكلي وتوزيعهم حسب المدارس والصفوف والشعب عن طريق قسم المعلومات والإحصاءات/ وزارة التربية والتعليم.

- المرحلة الأولى للدراسة :

شملت كافة المدارس الحكومية في المملكة والتي تتضمن الصفوف من الثامن حتى العاشر، وتم إرسال القوائم بهذه

المدارس إلى (OSH/CDC) حيث تم سحب عينة الدراسة حسب عدد الطلاب في المدرسة باستخدام العينة التتناسبية، وبذلك تم اختيار 50 مدرسة حكومية موزعة على جميع مدارس المملكة الشاملة لهذه الصنفوف.

- المرحلة الثانية للدراسة :

تم اختيار الصنفوف من المدرسة الواحدة بالطريقة العشوائية المنتظمة (عن طريق الحاسوب) بحيث تضمن إطار العينة في هذه المرحلة كافة الشعب الصيفية للصنفوف من الثامن - العاشر في المدرسة الواحدة، وكافة الطلبة في الشعبة الواحدة كانوا مؤهلين للمشاركة في الدراسة .

○ نسبة الاستجابة بين المدارس كانت 100 % ، ونسبة الاستجابة بين الطلاب كانت 90.3 % ، أكمل الاستبيان (2064) طالب وطالبة من أصل 2285 من 50 مدرسة .

2. أدلة الدراسة :

تم استخدام استبيان مكونة من 69 سؤال، واعتمدت على مجموعة من الأسئلة الموحدة بين جميع الدول لتوفير إمكانية المقارنة بين نتائج الدراسة في الدول المختلفة، وبعض الأسئلة تم تعديلها وإضافتها لتناءيم مع الظروف المحلية في كل دولة، وتضمنت الاستبيان على:

- بيانات شخصية .
- بيانات حول ممارسة التدخين .
- بيانات حول احتواء المناهج الدراسية على معلومات حول التدخين .
- بيانات عن محاولات التوقف عن التدخين .
- بيانات حول التعرض للتدخين السلبي .
- بيانات حول المعرفة والاتجاهات .
- بيانات حول التعرض للدعائية والترويج .
- بيانات عن طريقة الحصول على التبغ .
- بيانات حول استخدام الارجيلة

3. جمع البيانات :

تم جمع المعلومات من قبل فريق مدرب مكون من (14) جامع بيانات ، من كل من: وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم.

تم اعتماد أسلوب طوعي للمشاركة في الدراسة لحماية خصوصية الطلبة، بعد شرح أهداف الدراسة والتاكيد لهم بخصوص سرية البيانات وأنها لأغراض البحث العلمي، في حين كانت تتم تعبئة الاستبانة من قبل الطلبة أنفسهم على نماذج الإجابات الخاصة بالدراسة في الغرف الصفية، دون وجود أي من المعلمين أو الإداريين من المدرسة .

وتم جمع البيانات في 50 مدرسة موزعة على أنحاء المملكة بمجموع (74 صف) حيث تم جمع 2064 استبانة .

4. تحليل البيانات :

تم إرسال نماذج الإجابة إلى OSH/CDC وتم إدخال البيانات وتحليلها باستخدام برنامج Epi-info .

5. النتائج والمناقشات والتوصيات :

تم كتابة تقرير الدراسة من قبل أعضاء اللجنة المشرفة في وزارة الصحة على الدراسة والمكونة من:-

- د. مالك الحباشنة / مدير التوعية والإعلام الصحي .
- د. هبه أيوب / رئيس قسم الوقاية من أضرار التدخين
- د. وفاء الخياط / مديرية التوعية والإعلام الصحية .

النتائج:

جدول رقم (1) ممارسة عادة التدخين / دراسة 2009/الأردن
توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس وممارسة عادة التدخين

الجنس	الفئة	نفخة أو نفختين %	المدخنين الحاليين			من لم يدخن ولديه الاستعداد للبدء بالتدخين %
			غير ذلك ارجيله %	سجائر %	غير ذلك (سيجار ، غليون) %	
	المجموع	25.2 (30.7 – 20.4)	22.1 (27.1 – 17.9)	11.5 (15.6 – 8.4)	21.4 (25.8 – 17.6)	23.7 (27.3 – 20.5)
	ذكور	34.8 (40.5 – 29.6)	28.4 (34.2 – 23.2)	17.4 (22.1 – 13.6)	27.3 (31.5 – 23.5)	26.7 (31.8 -22.3)
	إناث	17.8 (22 – 14.3)	16.7 (21.9 – 12.5)	6.6 (8.9 – 4.9)	15.9 (20.5 – 12.1)	21.4 (25.6 – 17.7)

جدول رقم (1-1) دراسة 2009/الأردن
توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس واستخدام السجائر ومنتجات التبغ الأخرى

الجنس	الفئة	المدخنين الحاليين			من لم يدخن ولديه الاستعداد للبدء بالتدخين %
		غير ذلك ارجيله %	سجائر %	غير ذلك (سيجار ، غليون) %	
	المجموع	22.1 (27.1 – 17.9)	11.5 (15.6 – 8.4)	21.4 (25.8 – 17.6)	21.4 (25.8 – 17.6)
		28.4	17.4	27.3	27.3

(31.5 – 23.5)	(22.1 – 13.6)	(34.2 – 23.2)	ذكور
15.9 (20.5 – 12.1)	6.6 (8.9 – 4.9)	16.7 (21.9 – 12.5)	إناث

جدول رقم (2-1) دراسة 2009/الأردن
توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس وتجربة التدخين والاستعداد للبدء بالتدخين

الجنس	الفئة	من دخن سجائر نفحة أو نفختين %	من لم يدخن ولديه الاستعداد للبدء بالتدخين %
المجموع		25.2	23.7
ذكور		34.8	26.7
إناث		17.8	21.4

جدول رقم (3-1) دراسة 2009/الأردن
توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس وتدخين أول سيجارة قبل عمر 10 سنوات

الجنس	الفئة	من دخن سيجارة قبل عمر 10 سنوات %
المجموع		20.1 (25.6 – 15.5)
ذكور		16.4 (24.8 – 10.4)
إناث		23.8 (31.2 – 17.8)

تبين الجداول أعلاه :


- تدخين السجائر بين الذكور (%) 17.4 أعلى منه بين الإناث (%) 6.6 مع وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين التدخين والجنس .

- تدخين الارجيلة بين الذكور (27.1%) أعلى منه بين الإناث (15.6%) وتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التدخين والجنس
- نسبة من حاول تدخين السجائر لنفحة واحدة أو اثنتين كان (25.2%) بنسبة (34.8%) بين الذكور و (17.8%) بين الإناث .
- نسبة من لم يدخن ولديه الاستعداد للبدء بالتدخين حيث بلغت لدى الذكور (26.7%) ولدى الإناث (21.4%) ، ولا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الاستعداد للبدء بالتدخين والجنس.
- الجدول رقم (1-3) يبيّن أن نسبة تدخين أول سيجارة قبل عمر 10 سنوات (16.4%) و (23.8%) بين الذكور والإإناث على التوالي ، ولا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الجنس وتدخين أول سيجارة قبل عمر 10 سنوات .

**جدول رقم (1-4) / دراسة 2009/الأردن
نسب تدخين السجائر حسب الجنس والسنّة**

الجنس	سجائر	2003 %	2006 %	2009 %
المجموع		21	13.6	11.5
ذكور		25	17.2	17.4
إناث		14.8	8.3	6.6


**الرسم البياني رقم (1) دراسة 9002 / الأردن
نسب تدخين السجائر حسب الجنس والسنّة**



**جدول رقم (5-1) / دراسة 2009/الأردن
نسبة تدخين الارجيلة حسب الجنس والسن**

الجنس	المجموع	أرجيلة
ذكور	27.1	27.3
إناث	15.6	16.7
		2009 % 2006 %

**الرسم البياني رقم (2) دراسة 9002 / الأردن
نسبة تدخين الارجيلة حسب الجنس والسن**



جدول رقم (2) دراسة 2009/الأردن
توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس والتطرق الى موضوع التدخين ومخاطره في المدارس

الجنس	الفئة	نسبة من درس عن مخاطر التدخين %	نسبة من ناقش بالأسباب التي تدفع الشباب للتدخين %
المجموع	ذكور	39	43.6
ذكور	إناث	40.7	41.1
إناث		37.6	45.6

يبين الجدول رقم (2) أن نسبة الطالب الذي درسوا عن مخاطر التدخين (39%) من مجموع الطلاب بنسبة (40.7%) ذكور و (37.6%) إناث . والطلاب الذين ناقشوا الأسباب التي تدفع الشباب للتدخين بهذا العمر (43.6%) من مجموع الطلاب، ونسبة (41.1%) ذكور ، (45.6%) إناث .

جدول رقم (3) التعرض للتدخين السلبي /دراسة 2009/الأردن
توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس والمعتقدات والتعرض للتدخين السلبي

الجنس	نسبة من يتعرض للدخان من الغير في الأماكن العامة	نسبة من يتعرض للدخان من الغير في بيوتهم	نسبة من يمنع في الأماكن العامة التدخين يجب أن يذهبون أن التدخين يؤكدون أن الغير يضر بصحتهم	نسبة من لديه أحد أبويه أو كلاهما مدخن	نسبة من لديه معظم أو كل أصدقائه مدخنين

%	%	%	العامة %	%	%	الجنس
16.4	49.4	59.4	76.5	50.5	53.6	المجموع
22.1	46.8	72.7	79.7	50.6	50.6	ذكور
11.6	50.8	82.8	84.2	49.7	45.5	إناث

جدول رقم (1-3) / دراسة 2009/الأردن
توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس والتعرض للتدخين السلبي

يتعرض للدخان من الغير في الأماكن العامة %	يتعرض للدخان من الغير في بيوتهم %	الفئة الجنس
50.5	53.6	المجموع
50.6	50.6	ذكور
49.7	45.5	إناث

جدول رقم (2-3) دراسة 2009/الأردن
توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس والمعتقدات حول التدخين السلبي

نسبة من يؤكدون أن التدخين من الغير يضر بصحتهم %	نسبة من يظنون أن التدخين يجب أن يمنع في الأماكن العامة %	الفئة الجنس
59.4	76.5	المجموع
72.7	79.7	ذكور
82.8	84.2	إناث

جدول رقم (3-3) دراسة 2009/الأردن
توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس والتعرض للتدخين السلبي من الأقارب والأصدقاء

الجنس	الفئة	%	لديه أحد أبويه أو كلاهما مدخن	لديه معظم أو كل أصدقائه مدخنين
المجموع			49.4	16.4
ذكور			46.8	22.1
إناث			50.8	11.6

تبين الجداول أعلاه :

- نسبة من يتعرض للتدخين السلبي في البيوت هي (53.6%) بنسبة (50.6%) بين الذكور و (45.5%) بين الإناث .
- نسبة من يتعرض للتدخين السلبي في الأماكن العامة (50.5%) بنسبة (50.6%) بين الذكور و (49.7%) بين الإناث .
- نسبة من يعتقد بوجوب منع التدخين في الأماكن العامة هو (76.5%).
- نسبة من يؤكدون أن التدخين السلبي ضار بصحتهم هو (59.4%).
- نسبة من لديه أحد أبويه أو كلاهما مدخن هو (49.4%).
- نسبة من لديه معظم أو كل أصدقائه مدخنين هي (16.4%).

جدول رقم (4) أماكن تدخين الارجيلة / دراسة 2009/الأردن
توزيع أفراد الدراسة (كاففة الطلبة) حسب الجنس وأماكن تدخين الارجيلة

المكان	الجنس	المجموع %	ذكور %	إناث %
--------	-------	-----------	--------	--------

14.3	12	13.3	المنزل
1.3	8.2	4.1	مقاهي
1.3	2.6	1.9	المطاعم
1.3	4.3	2.7	منزل الصديق
5.2	11.7	8	أماكن أخرى

يبين الجدول أعلاه :

- أن نسبة تدخين الارجيلة داخل المنزل (13.3%) بنسبة (12%) بين الذكور و(14.3%) بين الإناث ولا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المكان والجنس ، يليها المقاهي بنسبة إجمالية (4.1%) ثم منزل الصديق بنسبة (2.7%).

جدول رقم (1-4) دراسة 2009/الأردن
توزيع أفراد الدراسة لمدخنين الارجيلة حسب الجنس ومكان التدخين

إناث %	ذكور %	المجموع %	الجنس	المكان
61.1 (70.8 – 50.3)	30.9 (40.6 – 22.6)	44 (52.9 – 35.5)		المنزل
8.4	20.4	15.3		المقاهي
5.2	6.4	6		المطاعم
7.3	14.5	11.1		منزل الصديق
18	27.8	23.6		أماكن أخرى

يبين الجدول أعلاه :

- حوالي نصف الطلبة الذين يدخنون الارجيلة (44%) يقومون بذلك في المنزل بنسبة (30.9%) من الذكور ونسبة (61.1%) بين الإناث ويوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الجنس وتدخين الارجيلة في المنزل .

- نسبة الطلبة الذين يدخنون ا لارجيلة في المقاهي (15.3%) تليها منزل الصديق بنسبة (%11.1).

جدول رقم (5) معتقدات الطلاب حول التدخين / دراسة 2009/الأردن

الاعتقاد بأن تدخين الارجيلة يجعل الإناث أكثر جاذبية	الاعتقاد بأن تدخين الارجيلة يجعل الذكور أكثر جاذبية	الاعتقاد بأن تدخين السجائر يجعل الإناث أكثر جاذبية	الاعتقاد بأن تدخين السجائر يجعل الذكور أكثر جاذبية	الفئة الجنس

%	%	%	%	
19.1	24.4	16.7	23.7	المجموع
21.1	24	19.8	25.1	ذكور
17.5	24.4	14.3	22.4	إناث

جدول رقم (1-5) / دراسة 2009/الأردن
توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس والاعتقاد بأن التدخين ينقص في الوزن

تدخين الارجيلة %	تدخين السجائر %	الفئة الجنس
		المجموع
		ذكور
43 (46.8 – 39.2)	51.4 (54.5 – 48.4)	
40.4 (45.8 – 35.3)	48.9 (53.7 – 44.1)	
45.2 (50.4 – 40)	53.3 (58.1 – 48.5)	إناث

تبين الجداول أعلاه :-

- أن نسبة اعتقاد الطلبة بان تدخين السجائر والارجيلة يجعل الذكور أكثر جاذبية (23.7%) و (24.4%) على التوالي اكبر من نسبة الاعتقاد بان تدخين السجائر والارجيلة يجعل الإناث أكثر جاذبية (16.7%) و (19.1%) على التوالي .
- حوالي نصف الطلبة (51.4%) يعتقدون ان تدخين السجائر ينقص الوزن بنسبة (48.9%) و (53.3%) بين الذكور والإإناث على التوالي ، ولا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الجنس والاعتقاد بان تدخين السجائر ينقص في الوزن .
- حوالي اقل من نصف الطلبة (43%) يعتقدون بان تدخين الارجيلة ينقص الوزن بنسبة (40.4%) و (45.2%) بين الذكور والإإناث على التوالي ، ولا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الجنس والاعتقاد بان تدخين الارجيلة ينقص في الوزن .

جدول رقم (6) الإعلام والإعلان / دراسة 2009/الأردن

الجنس	الفئة	نسبة من شاهدوا ملصقات أو لافتات دعائية للسجائر %	نسبة من شاهدوا دعاية للسجائر في صحفة أو مجلة خلال 30 يوم الماضية %	نسبة من لديهم شيء فيه دعاية لنوع من السجائر %	نسبة من سجائر مجاناً من مندوب شركات التبغ خلال 30 يوم الماضية %	نسبة من شاهدوا رسائل لمكافحة التدخين خلال 30 يوم الماضية %
المجموع		66.3	61.9	18.0	11 (13.9 – 8.7)	69.1
ذكور		64.1	59.4	22.1	13.7 (16.9 – 11)	66.1
إناث		67.8	63.6	15	8.7 (11.5 – 6.5)	71.2

يبين الجدول أعلاه رقم (6) أن:

- حوالي ثلثي الطلاب والطالبات (66.3%) شاهدوا ملصقات أو لافتات دعائية للسجائر .
- أكثر من ثلثي الطلاب والطالبات (69.1%) شاهدوا رسائل لمكافحة التدخين .
- نسبة من قدم لهم سجائر مجانية (11%) بنسبة 13.7% بين الذكور والتي هي أعلى منها بين الإناث (8.7%) ولا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الجنس وتقديم السجائر المجانية

- حوالي ثلثي الطلبة (61.9%) شاهدوا دعاية للسجائر في صحفة او مجلة .
- نسبة (18%) من الطلبة لديهم شيء فيه دعاية لنوع من السجائر

جدول رقم (7) مدى سهولة حصول الطلبة على السجائر/ دراسة 2009/الأردن

نسبة الطلبة اللذين يحصلون بالمجان على سجائر من مندوب شركات التبغ %	نسبة المدخنين الحاليين الذين يشترون السجائر من المتجر التي لا ترفض البيع بسبب العمر %	نسبة المدخنين الحاليين الذين يشترون السجائر من المتجر %	الفئة الجنس
11 (13.9 – 8.7)	89.5 (94.8 – 80)	41.1 (49.2 – 33.5)	المجموع
13.7 (16.9 – 11)	87.7 (94.4 – 75)	50.5 (59.4 – 41.7)	ذكور
8.7 (11.5 – 6.5)	92.8 (99.1 – 60.8)	24.4 (37.5 – 14.7)	إناث

جدول رقم (1-7) / دراسة 2009/الأردن

توزيع افراد الدراسة المدخنين حسب الجنس والحصول على السجائر من المتجر

نسبة المدخنين الحاليين الذين يشترون السجائر من المتجر التي لا ترفض البيع بسبب العمر	نسبة المدخنون الحاليين الذين يشترون السجائر من المتجر	الفئة الجنس
---	---	-------------

%	%	
89.5 (94.8 – 80)	41.1 (49.2 – 33.5)	المجموع
87.7 (94.4 – 75)	50.5 (59.4 – 41.7)	ذكور
92.8 (99.1 – 60.8)	24.4 (37.5 – 14.7)	إناث

جدول رقم (2-7) / دراسة 2009/الأردن
توزيع افراد الدراسة حسب الجنس والحصول على سجائر بالمجان من مندوب شركات التبغ

نسبة الطلبة الذين يحصلون بالمجان على سجائر من مندوب شركات التبغ %	الفئة الجنس	
		المجموع
11 (13.9 – 8.7)		
13.7 (16.9 – 11)	ذكور	
8.7 (11.5 – 6.5)	إناث	

تبين الجداول أعلاه أن :

- أقل من نصف المدخنين يشترون السجائر من المتجر بنسبة (%) 41.1 ، بنسبة (%) 50.5 و (%) 24.4 بين الذكور وإناث على التوالي ، ويوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الجنس وشراء السجائر من المتجر .

- نسبة الذين يشترون السجائر من المتاجر دون رفض بسبب العمر (89.5%) بنسبة (87.7%) بين الذكور ونسبة (92.8%) بين الإناث ، ولا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الجنس ورفض بيع السجائر بسبب العمر .
- نسبة الذكور (13.7%) والإإناث (8.7%) الذين يحصلون على عينات مجانية من السجائر من مندوب شركات التبغ ، ولا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الجنس وتقديم السجائر بالمجان من مندوب شركات التبغ .

**جدول رقم (8) الإقلاع عن التدخين/دراسة 2009/الأردن
توزيع أفراد الدراسة المدخنين حسب الجنس والرغبة في الإقلاع عن التدخين**

الفذة الجنس	المجموع	المدخنين الحاليين الذين يرغبون في الإقلاع عن التدخين الآن	%
		ذكور	إناث
	المجموع	53.2 (63.2 – 42.9)	
	ذكور	50 (59.5 – 40.5)	
	إناث	51.1 (73.8 – 27.9)	

يبين الجدول رقم (8) أعلاه :

- أن (53.2%) من الطلبة المدخنين يرغبون في الإقلاع عن التدخين بنسبة (50.0%) و(51.1%) بين الذكور والإإناث على التوالي ولا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الجنس والرغبة في الإقلاع عن التدخين .

المناقشة

المناقشة : GTYS2009 _ JORDAN

1. بالنسبة لممارسة عادة التدخين تبين الدراسة أن النسبة الإجمالية لتدخين السجائر بين الشباب قد انخفضت من (13.6%) عام 2006 الى (11.5%) عام 2009 .
2. تبين الدراسة أن النسبة الإجمالية لتدخين الارجيلة بين الشباب قد انخفضت من (22.7%) عام 2006 الى (20.7%) عام 2009 .
3. تبين الدراسة أن النسبة الإجمالية لمن دخن السجائر نفحة واحدة أو نفختين قد انخفضت من (32%) عام 2006 الى (25.2%) عام 2009 .
4. تبين الدراسة أن حوالي ربع الطلاب (23.7%) من الذين لم يدخنوا لديهم الاستعداد للبدء بالتدخين خلال العام المقبل .
5. بالنسبة للتطرق الى موضوع التدخين ومخاطرها في المدارس تبين الدراسة أن خمسي الطلاب (39%) قد درسوا عن مخاطر التدخين وقد انخفضت قليلاً مما كانت عليه في 2006 حيث وصلت (40.6%).
6. تبين الدراسة أن نسبة الذين نقشوا الأسباب التي تدفع الشباب للتدخين قد ارتفعت من (39%) عام 2006 الى (43.6%) عام 2009 .

7. بالنسبة للتعرض للتدخين السلبي تبين الدراسة أن نسبة التعرض للتدخين السلبي في البيوت والأماكن العامة (53.6%) و (50.5%) على التوالي وقد انخفضت هذه النسبة عام كانت عليه في 2006 حيث كانت (65%) و (62.8%) في البيوت والأماكن العامة على التوالي .
8. تبين الدراسة أن نسبة من يؤكدون ان التدخين السلبي يضر بصحتهم تصل الى (59.4%) بينما كانت عام 2006 (64.6%) مما يدل على زيادة برامج التوعية الخاصة للشباب حول التدخين وأضراره .
9. تبين الدراسة أن نسبة من يظنون أن التدخين يجب ان يمنع في الأماكن العامة (76.5%) بينما كانت عام 2006 (80.7%) ، كما تبين الدراسة أن نسبة الطلاب الذين لديهم معظم أو كل أصدقائهم مدخنين (16.4%) بينما كانت عام 2006 (17.4%) مما يدل على عدم تغيير المواقف والاتجاهات بالرغم من توفر المعرفة بالتدخين ومخاطرته لدى الطلاب في هذه الفئة العمرية .
10. بالنسبة لاماكن تدخين الارجيلة بحسب الدراسة أن (44%) من الطلبة الذين يدخنون الارجيلة يقوموا بتدخينها داخل بيوتهم أي (13.3%) من مجموع الطلبة الذين شاركوا في الدراسة. وهذه النسبة (13.3%) قد ارتفعت عاماً كانت عليه في دراسة 2006 حيث كانت (10.8%)، مما يدل على انخفاض الوعي لدى الآباء والأمهات بمخاطر تدخين الارجيلة بين الشباب .
11. تبين الدراسة أن ثلث الإناث (61.1%) يقمن بتدخن الارجيلة داخل المنزل، بينما ثلث الذكور فقط (30.9%) يقوموا بتدخين الارجيلة داخل المنزل ويمكن أن يكون سبب ذلك هو العادات والتقاليد التي تمنع الإناث من الخروج بالإضافة إلى قلة الوعي لدى الأهالي .
12. بالنسبة لمعتقدات الطلبة حول التدخين تبين الدراسة أن نسبة الطلبة الذين يعتقدون أن تدخين السجائر يجعل الذكور أكثر جاذبية (23.7%) وقد انخفضت عام كانت عليه في دراسة 2006 (34.5%) . كما تبين الدراسة أن نسبة الطلبة الذين يعتقدون أن تدخين السجائر يجعل الإناث أكثر جاذبية (16.7%)، وقد انخفضت عام كانت عليه في دراسة 2006 (29.1%)، ومن الممكن أن زيادة الوعي والتنقيف والمعرفة لدى الطلبة بمضار التدخين أدت إلى تغيير الاتجاهات والموافق لدى هذه الفئة بان التدخين لم يعد عامل لزيادة الجاذبية لدى الذكور والإنسان بالإضافة إلى أنه قد يكون هناك اسباب أخرى لدى الشباب تدفعهم إلى التدخين عدا عن كون التدخين احد عوامل الجاذبية لدى هذه الفئة .

13. تبين الدراسة أن نسبة الطلبة الذين يعتقدون أن تدخين الارجيلة يجعل الذكور أكثر جاذبية (24.4%) ، وان نسبة الطلبة الذين يعتقدون أن تدخين الارجيلة يجعل الإناث أكثر جاذبية (19.1%) .

14. تبين الدراسة أن الاعتقاد بأن تدخين السجائر والارجيلة يجعل الذكور أكثر جاذبية بنسبة (23.5%) و (24.4%) على التوالي أكثر منه لدى الإناث بنسبة (16.7%) و (19.1%) للسجائر والارجيلة على التوالي ويمكن أن يكون سبب ذلك هو ربط المجتمع عادة التدخين بالصفة الرجالية .

15. بالنسبة للإعلام والإعلان عن منتجات التبغ تبين الدراسة أن نسبة من شاهدوا ملصقات أو لاقنات دعائية للسجائر قد انخفضت من (73.1%) عام 2006 إلى (66.3%) عام 2009 ، ونسبة من شاهد دعاية للسجائر في صحيفة أو مجلة وقد انخفضت من (63.7%) عام 2006 إلى (61.9%) عام 2009 . كذلك تبين الدراسة أن نسبة من لديهم شيء فيه دعاية لنوع من السجائر قد انخفضت من (21%) عام 2006 إلى (18%) عام 2009 ، ونسبة من قدم لهم سجائر مجانا من مندوب شركات التبغ قد انخفضت من (17.4%) عام 2006 إلى (11%) عام 2009 ، مما يدل على أن التشريعات الخاصة بمنع الدعاية والإعلان والترويج للتبغ وخاصة بين الشباب قد تم تفعيلها بشكل أكبر مما كانت عليه سابقا .

16. تبين الدراسة أن نسبة من شاهدوا رسائل لمكافحة التدخين قد ارتفعت من (64.1%) عام 2006 إلى (69.1%) عام 2009 مما يدل على زيادة برامج التوعية والتنفيذ بأضرار التدخين ومكافحته .

17. بالنسبة لحصول الطلبة على السجائر تبين الدراسة ان نسبة المدخنين الحاليين الذين يشترون السجائر من المتجر (41.1%) يليها الحصول على السجائر من خلال الطلب من شخص اخر بنسبة (16.8%) بينما كان اقل نسبة للحصول على السجائر من خلال سرقتها من الاخرين بنسبة (8.1%).

18. تبين الدراسة ان نسبة الطلبة المدخنين الحاليين الذين يشترون السجائر من المتجر قد انخفضت من (43.6%) عام 2006 إلى (41.1%) عام 2009، بينما ارتفعت نسبة رفض بيع السجائر بسبب العمر من (75.7%) عام 2006 إلى (89.5%) عام 2009، مما يدل على تفعيل التشريعات الخاصة

بمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة بشكل اكبر مما كانت عليه سابقا .

تبين الدراسة أن نسبة الطلبة الذين يحصلون بالمجان على سجائر من مندوب شركات التبغ قد انخفضت من (13.5%) عام 2006 الى (11%) عام 2009 مما يدل على زيادة تفعيل التشريعات الخاصة بمنع الدعاية والترويج لمنتجات التبغ .

19. بالنسبة للإقلاع عن التدخين ، تبين الدراسة ان نسبة الطلبة المدخنين الحاليين الذين يرغبون بالإقلاع عن التدخين قد انخفضت من (58.2%) عام 2006 الى (53.2%) عام 2009 وقد يكون السبب عدم توفر المعرفة لدى الطلبة بأساليب الإقلاع عن التدخين وعدم توفر عيادة للإقلاع عن التدخين خاصة بهذه الفئة العمرية .

الوصيات

التوصيات:

1. إعداد برنامج توعوي لطلاب المدارس في الصفوف الأساسية الأولى للوقاية من البدء بالتدخين .
2. زيادة التوعية بمخاطر التدخين والتدخين السلبي لدى الطالب .
3. تضمين المناهج بمعلومات عن التدخين والارجيلة ومخاطرها وكيفية مكافحتها .
4. إجراء دراسة حول الأسباب التي تدفع الشباب للتدخين رغم تغيير الاتجاهات لدى هذه الفئة بان التدخين لم يعد عاملاً لزيادة الجاذبية لدى الذكور والإإناث .

5. إجراء دراسة حول اسباب تداول الشباب للارجيلة بنسبة اكبر منها للسجائر .
6. زيادة الأنشطة المدرسية اللامنهجية التي تساعد الطلبة على اخذ القرار بعدم التدخين والتعبير عن رأيهم بقوة وحرية .
7. تفعيل استخدام الدليل التقييفي للباقعين والباقعات حول مكافحة التدخين وتعاطي التبغ والذي اعدته وزارة الصحة ومنظمة اليونيسف
8. زيادة التوعية والتثقيف لدى الآباء والأمهات بمخاطر التدخين والتدخين السلبي ودورهم في إعطاء القدوة الحسنة لأبنائهم وأهمية متابعة أبنائهم دون التمييز بين الذكور والإناث .
9. زيادة التوعية والتثقيف بمخاطر الارجيلة واستخدامها بين المراهقين وخاصة لدى الآباء والأمهات.
10. إجراء دراسة بخصوص المعرفة والمعتقدات لدى الآباء والأمهات حول استخدام الارجيلة وخاصة في المنازل .

11. تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التدخين بشكل عام مع التركيز على التشريعات التي تمنع الدعاية والترويج ومداولة منتجات التبغ بين الأحداث .
12. إنشاء عيادة خاصة للاقلاع عن التدخين للمرأهفين والشباب.

وزارة الصحة
الأردن /
مديرية التوعية والإعلام الصحي
قسم الوقاية من أضرار التدخين