[illegible] 2013 [illegible]/[illegible] 9 4 [illegible] (MERS-CoV) [illegible] [illegible] [illegible]

المشتركة البعثة أوسطية الشرق التنفسية للمتلازمة المسبب (كورونا) التاجي الفيروس | WHO EMRO

ولا بد من التأكيد على نقطتين هامتين .

النقطة الأولى أنه ليس هناك أي دليل على حدوث سراية واسعة النطاق للعدوى بالمتلازمة التنفسية الشرق أوسطية بالفيروس التاجي (كورونا) من شخص إلى شخص. وفي الأماكن التي يشتبه فيها حدوث سراية الفيروس من شخص لآخر، أتضح أن هناك اتصال وثيق بين المريض والشخص الآخر، كأن يكون أحد أفراد الأسرة، أو أحد زملاء المريض، أو أحد العاملين في مجال الرعاية الصحية .

النقطة الثانية أنه تم الإبلاغ عن عدد من الإصابات بالمتلازمة التنفسية الشرق أوسطية بالفيروس التاجي (كورونا) بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية أقل مما كان متوقعاً على أساس الخبرة السابقة مع المتلازمة الرئوية الحادة الوخيمة (سارس). فخلال وباء السارس، كان العاملون في مجال الرعاية الصحية معرضين لخطر جسيم للإصابة بالعدوى . ولكن الفيروس التاجي للمتلازمة التنفسية الشرق أوسطية يختلف عن فيروس سارس . ومع أن سبب إصابة عدد أقل من العاملين في الرعاية الصحية بعدوى الفيروس التاجي ليس واضحاً، فإنه قد يعود إلى ما أحدثته التحسينات التي أجريت على مكافحة العدوى بعد حدوث فاشية السارس من اختلافات كبيرة . وفي هذا السياق، يبدو أن تدابير مكافحة العدوى في المملكة العربية السعودية ذات فعالية جيدة .

وفي الوقت الراهن، يعتمد تشخيص المتلازمة التنفسية الشرق أوسطية بالفيروس التاجي (كورونا) على نحو كبير على الوعي السريري جنباً إلى جنب مع التأكيد بالفحوصات المختبرية على وجود الفيروس التاجي (فيروس كورونا) المسبب للمتلازمة التنفسية الشرق أوسطية عن طريق التفاعل السلسلي للبوليميراز . ولا يوجد اختبار يمكن إجراؤه قرب سرير المريض .

يعتمد العلاج في المقام الأول على العلاج الداعم، وليس هناك أي بيانات مقنعة تفيد أن استخدام مضادات الفيروسات القوية، مثل ريبافيرين والإنترفيرون، يجلب أي فائدة .

وينبغي تجنب استخدام السترويدات بجرعات عالية .

واستعرضت البعثة المشتركة استجابة المملكة العربية السعودية، وخلصت إلى أن المملكة قد أدت عملاً ممتازاً في استقصاء ومكافحة الفاشيات . فمنذ التعرف على الحالات الأولى في عام 2012 ، اتخذت المملكة العديد من الخطوات، وهي تشمل ما يلي :

إدخال التدابير، ومنها تدابير مكافحة العدوى، لوقف الفاشيات في المستشفى

2 / 4

[illegible]

المشتركة البعثة أوسطية الشرق التنفسية للمتلازمة المسبب (كورونا) التاجي الفيروس | WHO EMRO

وبناء على ذلك، فإن على جميع البلدان في العالم أن تضمن أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية على دراية بالفيروس وبالمرض الذي يمكن أن يسببه، وعند اكتشاف حالات يتعذر تفسيرها من الالتهاب الرئوي، فإنه ينبغي الأخذ في الحسبان المتلازمة التنفسية الشرق أوسطية بسبب الفيروس التاجي (كورونا). وإذا اكتشفت حالات المتلازمة التنفسية الشرق أوسطية بسبب الفيروس التاجي، فإنها ينبغي الإبلاغ عنها إلى منظمة الصحة العالمية وفقاً لأحكام اللوائح الصحية الدولية (2005).

وحتى الآن، شوهدت جميع حالات المتلازمة التنفسية الشرق أوسطية بسبب الفيروس التاجي (فيروس كورونا) المكتسبة في المجتمع في بلدان الشرق الأوسط . وينبغي على جميع البلدان في هذا الإقليم تكثيف جهود الترصد على وجه السرعة .

Tuesday 23rd of April 2024 03:21:18 PM

4 / 4