

Tableau 3 Répartition de la fonction érectile selon la durée et le type du diabète

| Caractères du diabète | Capacité d'avoir ou de maintenir (sans traitement) une érection dans les 5 dernières années | | | | | Nbre (%) |
|-----------------------------------|---|-------|---------|--------|----------------|-----------|
| | Très bonne | Bonne | Moyenne | Faible | Très faible | |
| | % | % | % | % | % | |
| <i>Durée du diabète (ans)</i> | | | | | | |
| 0-5 | 0,0 | 15,9 | 6,8 | 52,3 | 25,0 | 44 (49,4) |
| 6-10 | 0,0 | 10,0 | 5,0 | 65,0 | 20,0 | 20 (22,5) |
| 11-15 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 60,0 | 20,0 | 10 (11,2) |
| > 15 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 60,0 | 33,3 | 15 (16,9) |
| <i>Type de diabète</i> | | | | | | |
| Type 1 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 70,0 | 10,0 | 20 (22,5) |
| Type 2 | 0,0 | 13,0 | 4,3 | 53,6 | 29,0 | 69 (77,5) |
| <i>Nombre</i> | 0 | 10 | 6 | 51 | 22 | 89 |