

Tableau 7 Résultats essentiels des études épidémiologiques sur l’histoire du diabète et du dysfonctionnement érectile (DE)

Référence	Population d'étude n	Âge (années)	DE (%)	Type de diabète
Modebe, 1990, Nigéria [5]	38	—	58	1 et 2
Brunner et al., 1995, Autriche [6]	59	—	49	1
Klein et al., 1996, USA [7]	359	21-76	20	1
Fedele et al., 1998, Italie [8]	9868	20-69	35,8	1 et 2
Fedele et al., 2000, Italie [9]	9868	20-69	26-37	1 et 2
Alexopoulou et al., 2001, Belgique [10]	51	48 (ET 14)	47	1
Siu et al., 2001, Hong Kong [11]	486	20-80	63,6	1 et 2
Bacon et al., 2002, USA [12]	31027	53-90	45,8	1 et
Guiliano et al., 2004, France [13]	2377	> 20	71	1 et 2
Miyata et al., 2004, Japon [14]	66	56 (ET 8,5)	95,5	1 et 2 ^a
Kalter-Leibovici et al., 2005, Israël [15]	1040	>18	86,5	1 et 2
Sasaki et al., 2005, Japon [16]	1118	40-79	90	2

^a*Diabétiques dans une clinique d'hémodialyse.*
ET : écart type.